

Mathematics


QA

315

.S595t



B 492265



THE GIFT OF
PROF. ALEXANDER ZIWET

2158

Alexander Zisch
BARNHARTZ

3

QA
315
-5595t

Jahresbericht

über das

Königl. Joachimsthalsche Gymnasium,

womit zu der

am 29. September stattfindenden öffentlichen Prüfung

ergebenst einladet

DR. F. G. KIESSLING

Provinzialschulrath und Director.

Vorausgeschickt ist eine Abhandlung des Adjunct Herrn Dr. O. Simon:
Die Theorie der Variationsrechnung.

Berlin.

Gedruckt in der Buchdruckerei der Königl. Akademie
der Wissenschaften.

1857.

Grad. R. R. 3

QA

315

.S595t

Die Theorie der Variationsrechnung.

Die Begränzung der Variationsrechnung gegen andere mathematische Disciplinen und ihr Zusammenhang mit denselben ist bestimmt durch ihren Gegenstand und ihre Methode. Diese Rechnungsart behandelt Probleme über grösste und kleinste Werthe aus der Geometrie und aus der Mechanik, aber nur wenn dieselben schon auf einen analytischen Ausdruck reducirt sind. Löst die Differenzialrechnung ähnliche Probleme, so vermag sie das ihr eigenthümliche expedite Verfahren doch nur in den Fällen anzuwenden, wo es sich um das Maximum oder Minimum unmittelbar gegebener Functionen handelt; soll aber das Integral einer nicht völlig bekannten Function einen grössten oder kleinsten Werth erhalten, so giebt die Variationsrechnung am leichtesten das Resultat. Da beide Rechnungsarten den Begriff des Unendlichkleinen gemeinsam haben, so ist zu erwarten, daß es der Differenzialrechnung nicht unmöglich sei, solche Aufgaben zu behandeln. In der That ist dieselbe das einzige Hülfsmittel gewesen, womit Probleme der Art in den Arbeiten der Bernoulli's, in der *Methodus inveniendi etc.* von Euler und zuletzt in der Abhandlung des Prof. Schellbach (Crelle XLI) gelöst worden sind; wie aber die Grundsätze der Differenzialrechnung anzuwenden sind, hierüber bedarf man für jedes einzelne Problem einer besondern Regel. Daher scheint ein solches Verfahren nicht diejenige Einfachheit und Allgemeinheit zu besitzen, welche der Variationsrechnung eigenthümlich ist.

Die besondere Art mathematischer Aufgaben, welche der Variationsrechnung anheimfallen, machen sie, wie Jacobi sagt, zu „einem der schönsten Theile der Mathematik“; der Methode aber ist oft der Vorwurf gemacht, es fehle ihr die Evidenz, die Durchsichtigkeit andrer Zweige der Analysis. Dazu kommt, daß sie von ihrem Begründer, Lagrange, gegen diesen Vorwurf nicht hinreichend vertheidigt wurde; vielmehr hat seine Bereitwilligkeit, dem Vorurtheil seiner Zeit gegen das Unendlichkleine nachzugeben, den Schein des Unsichern und Schwankenden auf sie geworfen. — Sie gegen jenen Vorwurf sicher zu stellen, durch Abschätzung der verschiedenen Begründungsarten ein sicheres und evidentes Verfahren zu gewinnen, ist die Aufgabe der folgenden Abhandlung.

1. Gegenstand der Variationsrechnung.

Lagrange hat in allen den Werken⁽¹⁾, welche die Variationsrechnung mehr oder weniger als Hauptsache behandeln, ihren Gegenstand in einem und demselben Sinne bestimmt. Er war sich bewußt, wo sie als Hülfsmittel angewandt war und werden konnte, und betrachtete sie als solches nur für gewisse Aufgaben über Maxima und Minima.

Eine Function von einer oder von zwei Variabeln läßt sich als Ordinate einer Linie oder einer Fläche darstellen; erhält sie einen größten oder kleinsten Werth, so ist die Tangente der Linie oder die Tangentialebene der Fläche parallel den durch die unabhängigen Variabeln dargestellten Coordinaten. Daraus ergibt sich, daß die Differenzialquotienten der Function nach den einzelnen Variabeln verschwinden müssen; die hierdurch gewonnenen Werthe der unabhängigen Variabeln bestimmen den größten oder kleinsten Werth der gegebenen Function. Das Erkennungszeichen dafür, ob ein Maximum oder ein Minimum gefunden ist, besteht in dem Vorzeichen der Werthe, welche die zweiten Differenzialquotienten der Function für die gefundenen Werthe der Variabeln erhalten. — Soll dagegen die Linie oder Fläche eine Eigenschaft besitzen, welche durch ein Integral ausgedrückt ist, und dieses für eine Function einen kleineren oder einen größeren Werth haben als für alle übrigen Functionen; so kann man zur Auffindung jener Function die Principien der Differenzialrechnung nicht mit der Leichtigkeit anwenden, mit welcher man bei der eben erwähnten Aufgabe verfuhr. Während dort die Variabeln, welche die Function bestimmen, als von einander unabhängig angesehen werden, hängt in den Aufgaben letzterer Art das Integral von den Relationen zwischen diesen Variabeln selbst ab, so daß man hier einer neuen Rechnungsart bedarf. Da nun die zu integrierende Function außer den Variabeln auch ihre Differenzialquotienten enthält, so würde das Integral nur einer einzelnen Curve angehören, wenn die Function von vorn herein den Bedingungen der Integrabilität genügte; die Aufgabe, welche unzählig viele Curven betrifft, würde also ungelöst bleiben. Vielmehr darf die Function nicht integrabel sein, ohne daß eine Relation zwischen den Variabeln gewonnen wird, und zwar der Art, daß das resulti-

⁽¹⁾ *Miscellanea Taurinensia* 1760. — *Théorie des fonctions analytiques*. — *Calcul des fonctions*.

rende Integral einen größten oder kleinsten Werth erhalte. Allgemein nun diese Relation für irgend eine Function aufzustellen, ist die Aufgabe der Variationsrechnung.

Um unter unendlich vielen Curven die gesuchte aufzufinden, bedurfte man eines neuen Begriffs, der den Übergang von einer Curve zur nächsten vermittelte. Es ergab sich daraus die Einführung unendlich kleiner Größen, welche nicht dem Gesetz einer gegebenen Function unterworfen sind, sondern zu ähnlichen, von der vorigen unendlich wenig verschiedenen, Functionen überführen. Diese Größen, Variationen, wurden aber nicht mehr als Hülfsmittel zu diesem Zwecke allein betrachtet, sondern zum Ausgangspunkte einer umfangreichen Doctrin gemacht; und doch hat man dadurch keine Resultate gewonnen, welche von denen über Maxima und Minima verschieden gewesen wären. Euler selbst, welcher im dritten Bande seiner Integralrechnung eine solche Lehre gegeben, kann diesen über den eigentlichen Zweck der Rechnung hinausgehenden Speculationen den Schein der Unfruchtbarkeit nicht absprechen: und wohl nur deshalb hat seine Abhandlung zur Aufklärung über manche schwierige Punkte dieser Rechnungsart weniger beigetragen, als von ihrer klaren und systematischen Anordnung zu erwarten ist. Auch Dirksen faßt in seiner analytischen Darstellung die Aufgabe der Variationsrechnung in noch weiterem Sinne als Euler auf; seine Untersuchungen können einerseits wegen ihrer Allgemeinheit und Unbestimmtheit die Hauptsache nicht erleichtern, und gelangen andererseits nicht zu einer wirklichen Erweiterung der Rechnung selbst oder ihrer Resultate. Wer die Entwicklung der Variationsrechnung historisch kennt, wird die eingeführten Begriffe nicht weiter zu verfolgen streben, als sie zur Lösung der oben angeführten Probleme dienen; so daß die Theorie der Variationen sich auf den Umfang beschränkt, der ihr durch Lagrange's Werke bestimmt ist.

II. Methode der Variationsrechnung.

Die Abhandlung Lagrange's in den Turiner Memoiren, welche sowohl wegen der darin zuerst aufgestellten Methode als auch wegen des Reichthums an neuen Resultaten die allgemeinste Bewunderung hat erregen müssen, gewährt keinen Einblick in den Gedankengang, der den großen Analytiker zu der Methode der Variationsrechnung geführt hat. Auch fehlt der darin gegebenen kurzen Begründung derselben jene Klarheit und Schärfe,

welche sonst den Werken Lagrange's das Gepräge der höchsten Vollendung aufdrücken. Wenn zuerst über die Principien der Differenzialrechnung bemerkt wird, daß sie noch nicht klar erkannt sind, so würde einem „einfachen Gebrauch eben dieser Principien“ derselbe Vorwurf zu machen sein; wahrscheinlich aber hat Lagrange damals jene Bemerkung einfließen lassen, um den Encyclopädikern ein Zugeständniß zu machen, obwohl er dadurch selbst seine neue Methode ihrem Tadel Preis gegeben hätte. Abgesehen von diesen Zweifeln über das Unendlichkleine, welche nur beweisen, daß in mathematischen Begriffen oft anderes gesucht wird als in ihnen enthalten sein kann, wenden wir uns zur Bestimmung der neu eingeführten Begriffe selbst.

Es wird angenommen, daß variable Größen sich auf zwei verschiedene Arten verändern, indem x einmal vermehrt wird um dx , das andre Mal um eine Differenz, welche „nicht dieselbe wie jene“ ist, und demnach mit δx zu bezeichnen ist: dieses δx soll jedoch nach denselben Regeln wie dx gebildet sein, so daß aus der Gleichung $dy = m dx$ sich unmittelbar auch $\delta y = m \delta x$ ergibt. Wenn hier zuerst zwei Arten der Variabilität vorausgesetzt werden, so sind dieselben allerdings analytisch möglich; wodurch diese Annahme nothwendig wird, bleibt unerörtert; die analytischen Begriffe an Zahlen oder geometrischen Anschauungen nachzuweisen, und dadurch ihnen den Schein unbestimmter Allgemeinheit zu nehmen, hat Lagrange meist verschmäht. Nichts aber wäre hier eher an der Stelle gewesen als ein solcher Nachweis, da man bis dahin die Differenziale als die Incremente einer Variablen betrachtete und sich jetzt zuerst eine neue Art von Incrementen vorstellen sollte. — Was nun die Bildung dieser Incremente betrifft, so verleitet der Ausdruck, dessen sich Lagrange bedient, leicht zu Mißverständnissen. Werden nämlich in der Gleichung $y = mx$ die Variablen durch Differenziale vermehrt, so ergibt sich $dy = m(x + dx) - mx$; und sollen die neuen Incremente „nach denselben Regeln“ gebildet werden, so würde das Increment der Function von zwei auf einander folgenden Werthen der Variablen abhängig zu sein scheinen. Hier aber darf diese Abhängigkeit im Allgemeinen nicht von der Function einer Variablen angenommen werden, für welche sie bei der Differenziation gilt. — Es wird die Analogie von dx und δx dann so weit ausgedehnt, daß ohne weitere Erörterung $\delta v = \int \delta v$ gesetzt wird; ebenso wird als leicht verständlich angenommen, daß $\delta dx = d\delta x$, und daß δv verschwinden muß, wenn das Integral

durch die Relationen zwischen den Variablen ein Maximum oder Minimum werden soll. Sieht man aber von allen diesen wenig begründeten Voraussetzungen sowie davon ab, daß v als Function betrachtet wird von $x, y, dx, d^2x, d^2y, \dots$, ohne daß eine unabhängige Variable für diese Differenziale angegeben ist, — wodurch die ganze Behandlung einen Widerspruch gegen die Grundbegriffe der Differenzialrechnung zu enthalten scheint — so ist im Übrigen die Aufgabe der Variationsrechnung in den Problemen der angeführten Abhandlung erschöpfend gelöst.

In der Anwendung dieser Lösung, z. B. in der Aufgabe von der Brachistochrone, zeigen sich nicht bloß die Vortheile der eingeführten Methode, welche die allgemeinste Behandlung dieses Problems gestattet; sondern noch deutlicher tritt der Fortschritt hervor, den man durch sie für die Betrachtung der äußersten Punkte der Curve gewonnen hat, eine Betrachtung, welche weder von den Bernoulli's, noch von Euler angestellt werden konnte. Wird nämlich v , wie schon angegeben, als Function von mehreren Variablen $x, y, z \dots$ und ihren Differenzialen $dx, d^2x, dy, d^2y, \dots$ betrachtet, so ist, den angeführten Regeln gemäß,

$$\begin{aligned} \delta v &= \frac{\partial v}{\partial x} \delta x + \frac{\partial v}{\partial dx} \delta dx + \frac{\partial v}{\partial d^2x} \delta d^2x + \dots \\ &+ \frac{\partial v}{\partial y} \delta y + \frac{\partial v}{\partial dy} \delta dy + \frac{\partial v}{\partial d^2y} \delta d^2y + \dots \\ &+ \frac{\partial v}{\partial z} \delta z + \frac{\partial v}{\partial dz} \delta dz + \frac{\partial v}{\partial d^2z} \delta d^2z + \dots \\ &+ \dots \end{aligned}$$

Bezeichnet man nun der Kürze halber die partiellen Differenzialquotienten von v nach x und dessen Differenzialen der Reihe nach mit n, p, q, \dots , die nach y resp. z genommen mit N, P, Q, \dots , resp. v, π, χ, \dots , so wird, um das Integral $\int v$ zu einem Maximum oder Minimum zu machen, die Variation desselben verschwinden, also die Gleichung stattfinden müssen:

$$\begin{aligned} 0 &= \int n \delta x + \int p \delta dx + \int q \delta d^2x + \dots \\ &+ \int N \delta y + \int P \delta dy + \int Q \delta d^2y + \dots \\ &+ \int v \delta z + \int \pi \delta dz + \int \chi \delta d^2z + \dots \\ &+ \dots \end{aligned}$$

Durch Umsetzung von d, d^2, \dots und δ , und durch partielle Integration aller derjenigen Ausdrücke, welche noch $d\delta$ oder $d^2\delta$ enthalten, resultirt

$$\begin{aligned} \int [(n - dp + d^2q - \dots) \delta x + (N - dP + \dots) \delta y + (v - d\pi + \dots) \delta z + \dots] \\ + (p - dq + \dots) \delta x + (q - dr + \dots) d\delta x + \dots + (P - dQ + \dots) \delta y \\ + (\pi - d\chi + \dots) \delta z + \dots = 0, \end{aligned}$$

wo der vom Integralzeichen freie Ausdruck den gegebenen Grenzen des Integrals entspricht. Nachdem die Variationen, welche der Natur des gestellten Problems gemäß von andern Variationen abhängen, eliminirt sind, ist zuerst der gesammte unter dem Integralzeichen stehende Ausdruck gleich 0 zu setzen; und da die übrig gebliebenen Variationen nicht durch einander bestimmt werden dürfen, so zerfällt die Gleichung in mehrere, deren Anzahl gleich der der unabhängigen Variationen ist:

$$n - d p + d^1 q - \dots = 0$$

$$N - d P + d^1 Q - \dots = 0$$

$$v - d \pi + d^1 \chi - \dots = 0.$$

Es ergibt sich daraus ein System von Differentialgleichungen, welche, mit einander combinirt, die Function bestimmen, für welche f_0 einen größten oder kleinsten Werth erlangt. Sodann sind die Variationen der Gränzgleichung auf die geringste Zahl zu reduciren; bezeichnet man die Werthe der Gröfsen für die Grenzen des Integrals mit den Indices 0 und 1, so bestimmt folgende Gleichung die Lage der Endpunkte der gesuchten Curve:

$$\left. \begin{aligned} & (p_1 - d p_1 + \dots) \delta x_1 + (q_1 - d q_1 + \dots) d \delta x_1 + \dots + (P_1 - d Q_1 + \dots) \delta y_1 + \dots \\ & - (p_0 - d p_0 + \dots) \delta x_0 - (q_0 - d q_0 + \dots) d \delta x_0 - \dots - (P_0 - d Q_0 + \dots) \delta y_0 - \dots \end{aligned} \right\} = 0.$$

Diese Rechnung giebt gleichsam eine Skizze, durch deren vollständige Ausführung die Methode alle mögliche Evidenz und Bestimmtheit erhalten kann. Lagrange aber hat die innere Vollendung seiner Schöpfung Euler überlassen; nachdem dieser die Mängel derselben beseitigt zu haben schien, wandte er sich selbst in seinen späteren Werken davon ab und suchte die Resultate auf einem andern, dem Vorurtheile seiner Zeitgenossen angemessenern Wege zu erreichen. Das Unendlichkleine, aus dem sich die ganze Methode entwickelte, mußte aufgegeben, und der Begriff der derivirten Function vom Ausgangspunkte genommen werden.

In dieser neuen Begründungsart, welche sich in den *Leçons sur le calcul des fonctions*, Leçon XXII, findet, kann nicht genug die Gewandtheit und Schärfe des Denkens bewundert werden, mit denen der Grundbegriff in die Form gekleidet wurde, die für ihn selbst die angemessenste und für die zu Grunde liegende Absicht die zweckmäfsigste war. Betrachtet man die Begründung der Theorie von diesem Standpunkt, so läßt sie sich bis zu ihrer Entstehung verfolgen; ihre einzeln Theile werden nicht nur klar, sondern nothwendig, und während sie zuerst verwickelt erschien, macht sie dann den Eindruck des vollendetsten analytischen Kunstwerkes. — Es war

schon oben festgestellt, daß eine GröÙe nicht bloß durch Differenziale, sondern auch auf eine zweite Art, durch Variationen, anwachsen könne: um in der Sprache der Derivirten-Theorie zu reden, muß also eine Function zwei nach verschiedenen unabhängigen Variablen genommene Derivirte haben. Ist z. B. y eine Function von x , so genügt die Derivirte von y nach x nicht, um Ersatz für die Variation zu geben; y ist außerdem auch abhängig zu denken von i , einer von x unabhängigen Variablen. Wird daher $y = \phi(x, i)$ gesetzt, so substituirt man die Derivirte von y nach x , $\phi'(x, i)$, für das Differenzial von y , und die Derivirte von y nach i , die durch $\phi''(x, i)$ bezeichnet wird, für die Variation von y . Die eingeführte Bezeichnungsweise zieht unmittelbar mehrere Folgerungen nach sich: da die Ordnung, in welcher nacheinander eine Function derivirt ist, umgekehrt werden kann, so ist offenbar $\phi'(x, i) = \phi''(x, i)$ d. h., in der Sprache der Variationsrechnung, das Differenzial der Variation ist gleich der Variation des Differenzials oder $d\delta y = \delta dy$. Wird ferner vorausgesetzt, daß v eine Function von x und y , also von x und i , und daß $V = U'$ ist, so wird die Derivirte von U nach i , \dot{U} , gleich der primitiven Function von V nach x sein; mit andern Worten, die Variation des Integrals ist gleich dem Integral der Variation oder $\delta \int v = \int \delta v$. Soll endlich U in Bezug auf alle beliebigen y , also auf i einen größten oder kleinsten Werth erhalten, so muß die Derivirte von U nach i verschwinden, d. h. $\delta \int v = 0$. Dieser Satz wird von Lagrange aus dem Taylorsche Theorem abgeleitet, indem U , eine Function von i , nach den Potenzen dieser Variablen in eine Reihe entwickelt wird; wenn aber hierbei vorausgesetzt wird, daß der Werth des zweiten Gliedes dieser Reihe, welches die erste Potenz von i enthält, die mit höhern Potenzen von i behafteten Glieder zusammengenommen übertrifft, so ist dies nicht anders möglich, als daß eben i als eine Variable aufgefaßt wird, die immer kleinere Werthe erhalten, d. h. nach 0 convergiren soll: hiermit ist die Theorie der Derivirten gezwungen, den Begriff des Unendlichkleinen zu ihrer Ergänzung anzunehmen. Aus der Reihenentwicklung selbst ergibt sich ferner, daß durch das Vorzeichen der zweiten Derivirten von U nach i , oder der zweiten Variation des Integrals, bestimmt wird, ob der gefundene Werth von U ein Maximum oder ein Minimum sei. — Wenn hiermit gezeigt worden ist, wie sich aus diesen Principien mehrere Grundsätze ableiten lassen, so ist noch die Durchführung derselben für die Lösung des eigentlichen Problems zu betrachten.

Ist V die zu integrierende Function von $x, y, y', y'' \dots$, und wird für y die $\phi(x, i)$ eingesetzt, so ist V als Function von i in eine Reihe zu entwickeln, die nach steigenden Potenzen von i fortschreitet, während x hierbei als constant anzusehen ist, so dafs

$$V = V_0 + \frac{i}{1} \dot{V}_0 + \frac{i^2}{1 \cdot 2} \ddot{V}_0 + \dots$$

wo der Index 0 bezeichnet, dafs in den von ihm behafteten Gröfsen i gleich 0 zu setzen ist. Durch Vergleichung dieser Reihenentwicklung mit der analogen für U ergibt sich leicht, dafs \dot{U}_0 die nach x genommene primitive Function von \dot{V}_0 ist; da aber nach dem oben angeführten Satz die Derivirte von U nach i verschwinden mufs, wenn U ein Maximum oder Minimum ist, so ist das nach x genommene Integral von \dot{V}_0 gleich 0 zu setzen. Um $V = f(x, y, y', y'', \dots)$ nach i zu deriviren, hat man die Regeln über Functionen von Functionen zu beachten, so dafs, wenn $f'(y), f'(y') \dots$ die Derivirten von V nach $y, y' \dots$ bezeichnen,

$$\dot{V} = \dot{y} f'(y) + \dot{y}' f'(y') + \dot{y}'' f'(y'') + \dots$$

Nachdem aus dieser Gleichung \dot{V}_0 gebildet, also überall $i = 0$ gesetzt ist, und endlich die Derivirten von f der Reihe nach mit $n, p, q \dots$ bezeichnet sind, wird die Bedingung, dafs \dot{U}_0 verschwinde, durch die Gleichung ausgedrückt

$$f(n \dot{y}_0 + p \dot{y}'_0 + q \dot{y}''_0 + \dots) = 0.$$

Diese zerfällt durch partielle Integration nach x in zwei, deren eine

$$n - p' + q'' \mp \dots = 0$$

die Form der Function ϕ für $y = \phi(x)$ bestimmt, während die andre die Werthe dieser Function für die Gränzwerte des Integrals ausdrückt.

Es wird sodann in mehr directer Weise als in den früheren Abhandlungen über diesen Gegenstand der Nachweis geliefert, dafs jene erstere Gleichung genügt, auch wenn x variirt oder als Function von i betrachtet wird; in diesem Falle wird nur die Grängleichung um ein Glied vermehrt. Zur Verallgemeinerung der Resultate wird ferner V als eine Function von beliebig vielen Variablen und deren Derivirten angesehen, und endlich der Fall discutirt, wo ein doppeltes Integral einen grössten oder kleinsten Werth erhalten soll. Von besonderer Wichtigkeit ist aber die hier zuerst gegebene eigenthümliche Behandlung derjenigen Bedingungsgleichungen, welche die in der zu integrierenden Function vorkommenden Variablen enthalten. Sind nämlich diese Bedingungsgleichungen sämmtlich auf die Form $L = 0$ gebracht,

wo L eine Function von $x, y, z, y', z', y'', z'', \dots$ ist; so muß auch die nach i genommene Derivirte \dot{L} verschwinden. Aus diesen Gleichungen würden einige der $\dot{y}, \dot{z} \dots$ durch andere ausgedrückt werden können, so daß in der Gleichung $\dot{U} = 0$ nach Einsetzung der gefundenen Werthe nur die Coefficienten der übrig gebliebenen Derivirten nach i gleich 0 gemacht würden. Da jedoch die Elimination dieser Größen oft langwierig und schwer auszuführen ist, hat Lagrange (cf. *Mécan. analyt.*) von folgendem Satze Gebrauch gemacht. Hat man eine Gleichung ersten Grades mit p unabhängigen Größen, und außerdem n Gleichungen, in welchen alle oder einige jener Größen linear vorkommen, so kann man jede dieser n Gleichungen, mit einem unbestimmten Factor multiplicirt, zu der ersten Gleichung addiren und die hieraus entstandenen Coefficienten der p Größen gleich 0 setzen; es ergibt sich dann nach Elimination der n unbestimmten Factoren ein System von Gleichungen, das mit dem durch directe Elimination der Größen erhaltenen System identisch ist. Nachdem also die Producte der Derivirten \dot{L} mit unbestimmten Factoren λ zu der linken Seite der ursprünglichen Gleichung $\dot{U} = 0$ hinzugefügt worden, vereinigt man die Glieder mit gleichen Derivirten \dot{y}, \dot{z}, \dots , setzt die Coefficienten $= 0$, und gewinnt durch Elimination der λ die Endgleichungen. Für die specielle Anwendung dieses Verfahrens auf die Probleme über relative Maxima und Minima, z. B. auf die isoperimetrischen Aufgaben, beweist Lagrange, daß jener unbestimmte Factor eine Constante ist; die Gleichung für die Gränzwerte bleibt demnach unverändert, und man hat nur dem Ausdruck \dot{V} noch ein Glied hinzuzufügen. Die ganze Ausführung der zu Grunde gelegten Theorie so wie die Behandlung einzelner Probleme zeugen von dem Scharfsinn des großen Meisters der Analysis; und nur die Principien selbst haben nicht die zu wünschende Einfachheit, weil sie in künstlichen Umformungen der ursprünglichen Gedanken bestehen.

Da aber die ursprünglichen Vorstellungen in ein schwer zu durchdringendes Dunkel gehüllt zu sein schienen, hat Euler nicht verschmäht, die Grundbegriffe der Variationsrechnung in systematischer Ordnung zu erläutern (*Instit. calc. integr.* Vol. III). Jedoch können unter den allgemeinen Definitionen Dinge begriffen werden, die von den definirten zu unterscheiden sind: es läßt sich dies aus dem Bestreben erklären, in die Definitionen keine durch Negationen ausgedrückte Beschränkungen aufzunehmen. So wird nach der ersten und wichtigsten Definition: „*Relatio inter binas varia-*

biles variari dicitur, si valor, quo altera inde per alteram determinatur, incremento infinite parvo augeri concipiatur...." schwer zu erkennen sein, ob nicht auch Differenziale zu den definirten Gröſſen gehören. Nachdem dagegen in den darauf folgenden Zusätzen der wahre Unterschied beider Arten von Incrementen klar ausgesprochen worden, weist Euler ihn an geometrischen Anschauungen nach, welche sehr geeignet sind, die schwierigeren analytischen Vorstellungen zu sondern, und ihnen gröſſere Bestimmtheit zu verleihen. Wenn in der Folge der Erklärungen die Variationen von drei Variabeln, zwischen denen zwei Relationen bestehen, als Functionen einer einzigen Variabeln angesehen werden, wofern diese Functionen nur selbst unendlich klein oder mit unendlich kleinen Factoren multiplicirt sind; so bleibt danach die Behauptung unverständlich, daſs für die Variationen von n Variabeln, welche durch $n - 1$ Relationen verbunden sind, nicht ein ähnlicher Satz gilt, und für $n = 2$ ein so bedeutender Unterschied stattfindet. Es wird im Gegentheil (§ 25) in völliger Allgemeinheit ausgesprochen, wenn n Relationen zwischen m Variabeln existiren, so seien die Variationen als Functionen von $m - n$ Variabeln auszudrücken, diese Functionen selbst aber in keiner Weise von einander abhängig zu denken. — Euler geht in dem zweiten Kapitel seiner Abhandlung zur Variation von Differenzialformeln über und macht den Anfang mit dem Satze, daſs die Variation des Differenzials gleich dem Differenzial der Variation sei. Bei dem zuerst gegebenen Beweise wird aber von ihm angenommen, daſs $\delta(V + dV)$ schon $\delta V + d\delta V$ sei, denn anderes kann in der Behauptung nicht liegen: „ $\delta(V + dV)$ ist der nächste Werth, in welchen die Variation, um ihr Differenzial vermehrt, übergeht.“ Die Herleitung des Satzes so wie diejenige, welche Euler aus der Betrachtung der Curven gewinnt, beruht aber keineswegs auf solcher Behauptung, die entweder eine Tautologie des bewiesenen Satzes ist, oder sogar als eine Folgerung aus demselben betrachtet werden kann; sondern auf den Begriffen der Variation und des Differenzials selbst, und ist daher in einfacher Weise darzustellen. Auch die Variation des Differenzialquotienten $\frac{dy}{dx}$ wird durch die Mittel der Variationsrechnung selbst zu gewinnen, die Form der Variation irgend eines Ausdrucks, der aus den Variabeln und ihren Differenzialen zusammengesetzt ist, klarer zu begründen sein, wenn die scharf zu begränzende Analogie der Variationsrechnung mit der Differenzialrechnung gleich zu Anfang in bestimmten Sätzen durchgeführt ist. — Für die Variation von Integralformeln, welche im dritten Kapitel behandelt wird, wäre der einfachste Beweis des

Satzes $\delta fV = f\delta V$ derjenige gewesen, welchen man aus der Variation des Differenzials gewinnt: je abstracter die einer Theorie zu Grunde gelegten Begriffe sind, um so mehr hat man sich auf die schon erhaltenen Resultate zu stützen, um nicht häufiger als nöthig ist denselben schwierigen Weg zurücklegen zu müssen. — Es beinträchtigt Euler's Ruhm nicht, daß die in den ferneren Abhandlungen behandelten Probleme von Lagrange in den Leçons mit größerer Gewandtheit und Kürze behandelt sind; offenbar genug ist ja der Fortschritt, den die Variationsrechnung in der Aufklärung ihrer Prinzipien durch Euler gemacht hat. Bewundernswerth ist es, wie bereitwillig er die Ausbildung einer Theorie übernimmt, welche einen großen Theil seiner früheren überall anerkannten Leistungen entbehrlich macht: die Wahrheit der Wissenschaft selbst leitet den gefeierten Meister zu dem Wege, den das junge Genie eben eröffnet hat. — Man hat auch Lagrange's und Euler's Werke als die einzigen Quellen für die Theorie der Variationsrechnung zu betrachten; ihre Arbeiten sind häufig von den Verfassern der Lehrbücher benutzt, aber es scheint, daß das Verständniß der Principien noch gefördert, mehrere Operationen übersichtlicher ausgeführt werden können. Die Theorie selbst ist seitdem erst durch Jacobi in einem wichtigen Punkte weiter entwickelt worden; ihre Anwendung auf neue Probleme ist meist durch die Schwierigkeit beschränkt, welche die aus der Rechnung resultirenden Differenzialgleichungen darbieten.

III. Theorie der Variationsrechnung.

Wenn y eine Function der Variablen x ist, so werden aus einer Gleichung zwischen beiden Größen alle Werthe von y durch die Werthe von x bestimmt. Einer unendlichkleinen Vermehrung oder Verminderung von x entspricht, gemäß jener Gleichung, eine Vermehrung oder Verminderung von y , die bei einem stetigen y ebenfalls unendlichklein ist. Ein solches Increment der Function heißt ihr Differenzial; fügt man daher zu beiden Größen y und x ihre Differenziale hinzu, so genügen $y + dy$ und $x + dx$ derselben Gleichung wie y und x . — Man kann sich aber denken, daß man y und x unendlichkleine Zuwächse ertheilt, so daß — wenn man die vermehrten Werthe in die erste Gleichung einsetzt — diese nicht mehr erfüllt

wird. Ein solches Increment der einen Gröfse kann also nicht durch zwei aufeinanderfolgende Werthe der andern Gröfse gegeben sein, d. h. diese Zuwächse haben nicht den durch die Form der Function bestimmten Zusammenhang unter einander. Dieser unendlichkleine Zuwachs der Function, welcher von dem Zuwachs der Variablen nicht abhängt, ist demnach vom Differenzial verschieden: er heifst Variation und wird mit δy oder δx bezeichnet.

Insofern jede Function von einer Variabeln sich als Coordinate einer Curve darstellen läßt, deren Abscissen durch die Werthe der unabhängigen Variablen bestimmt werden; entsprechen auch zwei unendlichwenig von einander verschiedenen Abscissen zwei aufeinanderfolgende Ordinaten dieser Curve, deren Unterschied die Darstellung des Differenzials der Function ist. — Vermehrt man die Abscisse um eine unendlichkleine Gröfse, aber die Ordinate nicht um den entsprechenden Zuwachs, sondern um eine völlig beliebige unendlichkleine Gröfse, so wird der Endpunkt der Ordinate nicht mehr auf der gegebenen Curve, sondern auf einer neuen liegen, die jener unendlich nahe ist. Giebt man also der Variablen und ihrer Function die Variation δx und δy , so wird die entstandene Gleichung durch eine neue Curve dargestellt, deren Punkte von denen der vorigen unendlichwenig entfernt sind. Man kann sogar, um sämtliche unendlichnahen Curven zu erhalten, annehmen, daß die Variationen nicht nur nicht den durch die Natur der gegebenen Curve bestimmten Zusammenhang haben, sondern überhaupt nicht von einander abhängen. Daher läßt sich δy als unendlichkleine Variable betrachten, z. B. als Function von y , die mit einem unendlichkleinen Factor multiplicirt ist; sind also die Coordinaten um die Variationen vermehrt, so ist dadurch der ganze Lauf der neuen Curve bestimmt. An dieser geometrischen Anschauung wird nun besonders deutlich, daß, nachdem durch die Variationen die neue Curve gegeben ist, auch die Richtungen der Tangenten und die Krümmungsradien dieser Curve nicht mehr willkürlich sind. Diese aber müssen durch die Variationen der ersten und zweiten Differenzialquotienten der Function ausgedrückt werden; woraus zu ersehen ist, daß — allgemein gefaßt — die Variationen der Differenzialquotienten einer Function abhängen von den Variationen der Function und ihrer Variablen.

In ähnlicher Weise lassen sich drei Variablen, die durch eine oder zwei Relationen mit einander verbunden sind, durch Variationen vermehren,

welche untereinander keinen Zusammenhang haben. Ist nur eine Relation gegeben, so läßt sich das System aller durch Variationen veränderten Gleichungen durch aufeinander folgende Flächen darstellen. — Zwei Relationen aber kann man sich so umgeformt denken, daß jede derselben nur zwei Variable enthält, und daher als Cylinderfläche zu construiren ist; beide Relationen zusammen bestimmen also den Schnitt dieser Flächen, der im Allgemeinen eine Curve doppelter Krümmung giebt. Werden nun die Variablen durch Variationen vermehrt, so entstehen beliebige, doch der ersten Curve unendlichnahe Curven: ihre Projectionen auf die Coordinatenebenen sind gleichfalls von den Projectionen der ursprünglichen Curve unendlichwenig entfernt. Hieraus ist leicht ersichtlich, daß die Variationen der Differenzialquotienten zweier Variablen nach einer dritten abhängen von den Variationen der einen entsprechenden und der dritten Variablen.

Das bisher Gesagte läßt sich leicht auf n Variable ausdehnen, welche durch m Relationen verbunden sind: vorausgesetzt, daß $m \leq n - 1$. Die geometrische Anschauung kann zwar im Allgemeinen nicht mehr angewandt werden; doch bedürfen die durch dieselbe erläuterten Begriffe hier nicht mehr einer besondern Erörterung.

Wird von Variablen, die unabhängig sind oder durch Relationen als Functionen der unabhängigen bestimmt werden, ein Ausdruck gebildet, der eine von ihnen abhängige GröÙe darstellt; so ist zu bedenken, daß diese GröÙe selbst alle beliebigen Veränderungen erfährt, wenn man sämtliche Variablen durch alle möglichen Variationen vermehrt. Einem solchen Ausdruck, der also von den veränderlichen GröÙen und ihren Relationen abhängt, braucht man daher nicht mehr unabhängige Variationen zu ertheilen; man betrachtet vielmehr seine Variation als abhängig von denen der Variablen. Um dies an einem Beispiel anschaulich zu machen, denke man sich eine Curve, welche zwei, nicht in derselben Horizontalen liegende Punkte verbindet. Ein beweglicher Punkt, welcher vom ersten gegebenen Punkt längs der Curve bis zur zweiten herabfällt, erlangt am letztern eine Geschwindigkeit, welche von der Natur der gedachten Curve abhängig ist. Diese Geschwindigkeit ist also ein Ausdruck, der von den Coordinaten der Curve gebildet wird. Durch die Variationen der Variablen, welche die Coordinaten darstellen, geht man zu allen der gedachten Curve unendlich-nahen Curven über, und durch neue Variationen gelangt man zu allen die beiden gegebenen Punkte verbindenden Linien. Die Geschwindigkeiten,

welche der bewegliche Punkt auf allen diesen Curven nacheinander erhält, werden durch Gröſſen von aufeinanderfolgenden Werthen ausgedrückt. Man erhält alle diese Werthe, wenn man in den Ausdruck der ursprünglichen Geschwindigkeit die variirten Coordinaten einsetzt; daher ist die Variation der Geschwindigkeit als abhängig von den Variationen der Variablen zu betrachten. Alle unabhängigen Variablen aber, so wie alle abhängigen Variablen, durch deren Relationen mit jenen oder mit einander die Form eines solchen Ausdruckes bestimmt wird, müssen — um die verlangte Allgemeinheit zu erreichen — beliebige, von einander durchaus unabhängige Variationen erhalten. Der Ausdruck, dessen Variationen hiernach als von andern abhängig betrachtet werden, ist durch den Sinn jedes einzelnen Problems bestimmt.

Ist A ein solcher Ausdruck, welcher von x und dessen Function y gebildet ist, und dessen Form durch $\phi(x, y)$ bezeichnet werde, so erhält man die Variation von A , δA , indem man x und y um ihre von einander unabhängigen Variationen vermehrt, und von dem so variirten A den ursprünglichen Werth subtrahirt. Daher

$$\delta A = \phi(x + \delta x, y + \delta y) - \phi(x, y).$$

Man addire und subtrahire $\phi(x, y + \delta y)$, dividire und multiplicire mit δx und δy , so erhält man

$$\delta A = \frac{\phi(x + \delta x, y + \delta y) - \phi(x, y + \delta y)}{\delta x} \delta x + \frac{\phi(x, y + \delta y) - \phi(x, y)}{\delta y} \delta y.$$

Da nun in der Differenzialrechnung allgemein bewiesen wird, daß

$$\frac{\phi(x + \zeta) - \phi(x)}{\zeta},$$

wo ζ unendlich klein, eine Function von x , und zwar der Differenzialquotient von $\phi(x)$ nach x ist; so folgt, der Annahme über die Gröſſe von δx , δy gemäß, daß mit Fortlassung des Unendlichkleinen höherer Ordnung

$$\delta A = \frac{\partial \phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \delta y;$$

d. h.: die abhängige Variation eines Ausdrucks ist die Summe der partiellen Differenzialquotienten des Ausdrucks nach den einzelnen Variablen, multiplicirt mit den unabhängigen Variationen der resp. Variablen.

Hieraus folgt: Die abhängige Variation einer Summe von Variablen ist die Summe der unabhängigen Variationen der Variablen.

$$\delta(x + y + z + \dots) = \delta x + \delta y + \delta z + \dots$$

Die abhängige Variation eines Productes von Variablen ist die Summe

der Produkte, welche aus allen Variablen weniger einer und der unabhängigen Variation dieser einen gebildet sind.

$$\delta(xyz \dots) = yz \dots \delta x + xz \dots \delta y + xy \dots \delta z + \dots$$

Erhält A außer den Variablen auch die Differenzialquotienten einiger Variablen nach ändern, so sind auch diese zu variiren; da sie selbst noch nicht als Functionen der Variablen allein gegeben sind, so bildet man die partiellen Differenzialquotienten nach ihnen, betrachtet aber ihre Variationen als abhängig von denen der ursprünglichen Variablen; daher wird δA nur bestimmt durch die letzteren. Stellen wir jedoch für jetzt die Variationen der Differenzialquotienten $y', y'', \dots, z', z'', \dots$ durch $\delta y', \delta y'', \dots, \delta z', \delta z'', \dots$ dar, so ist

$$\delta A = \delta \phi(x, y, y', y'', \dots, z, z', z'', \dots) = \frac{\partial \phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \phi}{\partial y'} \delta y' + \frac{\partial \phi}{\partial y''} \delta y'' + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial z} \delta z + \frac{\partial \phi}{\partial z'} \delta z' + \dots$$

Wiewohl bisher nur die Variationen erster Ordnung in Rechnung gezogen sind, so ist doch zu bedenken, daß $\phi(x + \delta x, y + \delta y, \dots)$ in eine Reihe entwickelt werden kann, welche nach den Potenzen der unabhängigen Variationen $\delta x, \delta y, \dots$ fortschreitet. Die abhängige Variation von ϕ ist nämlich eine Function von $\delta x, \delta y, \dots$; für sie kann daher nach dem Taylorschen Satze folgende Reihe gebildet werden:

$$\phi(x + \delta x, y + \delta y, \dots) = \phi(x, y, \dots) + \frac{\partial \phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \delta y + \dots + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \delta x^2 + \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \delta x \delta y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \delta y^2 + \dots$$

Das zweite und dritte Glied der Reihe ist zusammenzufassen in $\delta^2 \phi$; da die drei folgenden Glieder aus $\delta^2 \phi$ gebildet sind wie $\delta^2 \phi$ aus ϕ selbst, so wird man sie als die zweite Variation von ϕ betrachten und mit $\delta^2 \phi$ bezeichnen.

Soll nun $\phi(x, y, \dots)$ einen größten oder kleinsten Werth haben, so er giebt hier dieselbe Betrachtung wie in der Differenzialrechnung, daß die Gleichung $\delta \phi = 0$ erfüllt werden muß; das negative oder positive Vorzeichen von $\delta^2 \phi$ bestimmt, ob der in Rede stehende Ausdruck ein Maximum oder Minimum sei. Nur werden sich aus der Gleichung $\delta \phi = 0$ nicht einzelne Werthe der Variablen ergeben, sondern Relationen zwischen ihnen und ihren Differenzialquotienten, durch welche man die Form der Functionen und damit den Zusammenhang zwischen den einzelnen Variablen zu finden hat.

Satz I.

Die Variation eines Differenzials dy ist gleich dem Differenzial der Variation δy .

Beweis. Werden durch y und $y + dy$ zwei unendlichwenig verschiedene Werthe einer Function bezeichnet, so erhält man durch Variation beider, $y + \delta y$ und $y + dy + \delta(y + dy)$, zwei aufeinanderfolgende Werthe einer neuen Function. Zu dem auf $y + \delta y$ folgenden Werthe letzterer Function gelangt man aber auch durch Differenziation, so daß derselbe $y + \delta y + d(y + \delta y)$ wird. Nachdem daher die Gleichung gebildet

$$y + dy + \delta(y + dy) = y + \delta y + d(y + \delta y),$$

ergiebt sich nach Fortlassung der gleichen Glieder auf beiden Seiten:

$$\delta dy = d\delta y.$$

Anmerkung. Sind zZ und z, Z , zwei unendlichnahe liegende Ordinaten einer Curve, so gelangt man durch Hinzufügung der Variation $Z\zeta$ zu einer neuen Curve, deren Ordinate daher $z\zeta$ ist. Indem man z, Z , um die Variation Z, ζ , verlängert, erhält man die auf $z\zeta$ folgende Ordinate z, ζ , derselben neuen Curve. Demnach findet auch die Gleichung statt: $z\zeta + d(z\zeta) = z, \zeta$, d. h.

$$zZ + \delta(zZ) + d(z\zeta) = zZ + d(zZ) + \delta(z, Z),$$

oder

$$\delta(z, Z - zZ) = d(z\zeta - zZ),$$

welche Gleichung zu demselben Resultate führt.

Übrigens hat dieser Satz nur dann einen Sinn, wenn man unter δy eine unendlichkleine Variable versteht; ihre Beziehung zu y muß aber der Allgemeinheit wegen völlig unbestimmt bleiben.

Zusatz: Aus Satz I ergiebt sich dadurch, daß man die Umsetzung der Zeichen d und δ wiederholt, daß $\delta d^*y = d^*\delta y$.

Satz II.

Die Variation des Differenzialquotienten n^{te} Ordnung $\frac{d^n y}{dx^n}$ ist gleich dem n^{te} Differenzialquotienten von $\delta y - \frac{dy}{dx} \delta x$, vermehrt um das Produkt von δx mit dem Differenzialquotienten $n + 1^{\text{te}}$ Ordnung $\frac{d^{n+1} y}{dx^{n+1}}$.

Beweis. Setzt man $\frac{dy}{dx} = a$, so ist nach dem Satz über die Variation eines Produktes $\delta dy = a \delta dx + \delta a \cdot dx$; nachdem hieraus δa bestimmt, Satz I angewandt, und endlich $\frac{da}{dx} (= \frac{d^2y}{dx^2})$ addirt und subtrahirt ist, gelangt man zu

$$\delta \frac{dy}{dx} = \frac{a \left(\delta y - \frac{dy}{dx} \delta x \right)}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2} \delta x.$$

Nimmt man nunmehr an, daß auch

$$\delta \frac{a^{n-1}y}{dx^{n-1}} = \frac{a^{n-1} \left(\delta y - \frac{dy}{dx} \delta x \right)}{dx^{n-1}} + \frac{d^2y}{dx^2} \delta x,$$

und setzt man $\frac{a^{n-1}y}{dx^{n-1}} = \mu$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \nu$, so ist hiernach

$$\delta \mu - \nu \delta x = \frac{a^{n-1} \left(\delta y - \frac{dy}{dx} \delta x \right)}{dx^{n-1}};$$

da ferner $\frac{d\mu}{dx} = \nu$, so hat man nach Anwendung derselben Operationen wie oben $d\delta\mu = \nu d\delta x + \delta\nu \cdot dx$, d. h.

$$\delta\nu = \frac{d(\delta\mu - \nu\delta x)}{dx} + \frac{d\nu}{dx} \delta x.$$

Durch Gebrauch des eben gefundenen Ausdrucks für $\delta\mu - \nu\delta x$, erhält man

$$\delta \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{a \left(\delta y - \frac{dy}{dx} \delta x \right)}{dx^2} + \frac{d^3y}{dx^3} \delta x.$$

Da der erste Theil des Beweises zeigt, daß der Satz für $n = 1$ gilt, so folgt aus seinem zweiten Theil, daß der Satz für jedes beliebige ganze n stattfindet.

Zusatz. Es ergibt sich hieraus, daß wenn ein aus x , ihrer Function y und deren Differenzialquotienten $y', y'' \dots$ zusammengesetzter Ausdruck $A = \phi(x, y, y', y'' \dots)$ gegeben ist, die Variation von A aus folgender Gleichung bestimmt wird, in welcher man Δ für $\delta y - \frac{dy}{dx} \delta x$ gesetzt hat:

$$\delta A = \frac{\partial \phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \phi}{\partial y'} \left(\frac{d\Delta}{dx} + y' \delta x \right) + \frac{\partial \phi}{\partial y''} \left(\frac{d^2\Delta}{dx^2} + y'' \delta x \right) + \dots$$

Satz III.

Die Variation eines Integrals ist gleich der Variation der zu integrierenden Function.

Beweis. Ist das Integral $\int V dx$, und bezeichnet U dessen Werth, so ist $dU = V dx$. Da nun $\delta dU = \delta dU$ ist, so gilt auch, indem man die willkürliche Constante unter dem unbestimmten Integralzeichen mitbegriff: $\int \delta dU = \int \delta dU$. Es ist aber $\int \delta dU = \delta U$, daher erhält man durch Einsetzung der Werthe von U und dU

$$\delta \int V dx = \int \delta(V dx).$$

Aufgabe I.

Die Variation eines Integralausdruckes so umzuformen, daß unter dem Integralzeichen kein Differenzial einer Variation bleibt.

Auflösung. Gegeben sei das Integral $\int_{x_0}^{x_1} \phi(x, y, y', y'', \dots) dx$, dessen Variation der Kürze halber mit $\delta \phi dx$ bezeichnet werde; der höchste Differenzialquotient von y , der in ϕ vorkommt, sei von der n^{te} Ordnung.

Nach Satz III ist $\delta \phi dx = \int \delta(\phi dx) = \int (\delta \phi \cdot dx + \phi \delta dx)$. Da für $\phi \delta dx$ auch $\phi \delta \delta x$ gesetzt wird, so ergibt sich durch partielle Integration hierfür $\phi \delta x - \int d\phi \cdot \delta x$, wo $d\phi$ das totale Differenzial von ϕ nach x bezeichnet. Von der Gleichung

$$\delta \phi dx = \phi \delta x + \int (\delta \phi \cdot dx - d\phi \cdot \delta x)$$

ist jetzt also nur noch das letzte Integral zu behandeln. Aus dem Zusatz zu Satz II hat man

$$\delta \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \delta y + \frac{\partial \phi}{\partial y'} \left(\frac{d\delta}{dx} + y'' \delta x \right) + \frac{\partial \phi}{\partial y''} \left(\frac{d^2 \delta}{dx^2} + y''' \delta x \right) + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n)}} \left(\frac{d^n \delta}{dx^n} + y^{(n+1)} \delta x \right).$$

Setzt man ferner für dy, dy', dy'', \dots die gleichbedeutenden $y' dx, y'' dx, y''' dx, \dots$, so erhält man

$$\delta \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y} y' \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y'} y'' \delta x + \frac{\partial \phi}{\partial y''} y''' \delta x + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n)}} y^{(n+1)} \delta x.$$

Nachdem man $\delta \phi$ mit dx , $d\phi$ mit δx multiplicirt und letzteres Product vom erstern abgezogen, wird

$$\delta \phi \cdot dx - d\phi \cdot \delta x = \frac{\partial \phi}{\partial y} \Delta dx + \frac{\partial \phi}{\partial y'} \frac{d\Delta}{dx} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y''} \frac{d^2 \Delta}{dx^2} dx + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n)}} \frac{d^n \Delta}{dx^n} dx$$

Der rechts stehende Ausdruck soll so umgeformt werden, daß nur ein Product von Δ mit noch unbekannten, von Δ freien Factoren unter dem Integralzeichen bleibt; der andre Theil des Ausdrucks wird daher integrabel,

d. h. ein Differenzialquotient nach x werden. Setzt man demnach den ganzen Ausdruck gleich

$$\phi \cdot \Delta dx + \frac{d\xi}{dx} dx,$$

so wird ξ alle Differenzialquotienten von Δ bis zu dem der $n - 1^{\text{ten}}$ Ordnung enthalten müssen. Sei deshalb, wenn die Factoren ρ noch unbekannte Functionen bezeichnen,

$$\xi = \rho_0 \Delta + \rho_1 \frac{d\Delta}{dx} + \rho_2 \frac{d^2 \Delta}{dx^2} + \dots + \rho_{n-1} \frac{d^{n-1} \Delta}{dx^{n-1}}.$$

Durch Vergleichung der mit Δ , $\frac{d\Delta}{dx}$, ... behafteten Glieder beider Ausdrücke erhält man leicht

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial y} &= \phi + \frac{d\rho_0}{dx}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y'} = \rho_0 + \frac{d\rho_1}{dx}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y''} = \rho_1 + \frac{d\rho_2}{dx}, \\ &\dots \quad \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n-1)}} = \rho_{n-1} + \frac{d\rho_n}{dx}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n)}} = \rho_n. \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich unmittelbar:

$$\begin{aligned} \rho_{n-1} &= \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n-1)}} - \frac{d \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n)}}}{dx}, \quad \dots \quad \rho_1 = \frac{\partial \phi}{\partial y''} - \frac{d \frac{\partial \phi}{\partial y'''} }{dx} \pm \dots + (-1)^{n-1} \frac{d^{n-1} \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n)}}}{dx^{n-1}}, \\ \rho_0 &= \frac{\partial \phi}{\partial y'} - \frac{d \frac{\partial \phi}{\partial y''}}{dx} + \frac{d^2 \frac{\partial \phi}{\partial y'''} }{dx^2} \mp \dots - (-1)^n \frac{d^n \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n+1)}}}{dx^n}; \end{aligned}$$

und daher

$$\phi = \frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{d \frac{\partial \phi}{\partial y'}}{dx} + \frac{d^2 \frac{\partial \phi}{\partial y''}}{dx^2} \mp \dots + (-1)^n \frac{d^n \frac{\partial \phi}{\partial y^{(n+1)}}}{dx^n}.$$

Die Variation des Integrals erhält daher die Form:

$$\delta \int \phi dx = \phi \delta x + \xi + \int \phi \cdot \Delta dx,$$

wo in $\phi \delta x + \xi$ für die Variabeln die den Gränzen des Integrals entsprechenden Werthe einzusetzen sind.

Anmerkung. Wenn der aus Variabeln, abhängigen und unabhängigen, so wie aus deren Differenzialquotienten zusammengesetzte Ausdruck als ein Integral erscheint, so hängt dessen Form von den noch unbekannten oder nur theilweise gegebenen Relationen zwischen jenen Variabeln ab; eine solche Relation kann als analytischer Ausdruck der Bedingung betrachtet werden, welche die Aufgabe für den Integralausdruck festsetzt. Dies führt zu dem wichtigsten Problem der Variationsrechnung.

Aufgabe II.

Wenn in dem Integral $\int_{x_0}^{x_1} \phi(x, y, y', y'', \dots, z, z', z'', \dots) y, z$ unbekannte Functionen von x , und $y', y'', z' \dots$ deren Differenzialquotienten bezeichnen, so ist die Bedingung analytisch auszudrücken, daß jenes Integral zwischen den gegebenen Gränzen einen größten oder kleinsten Werth haben soll.

Auflösung. Nach den Erörterungen pag. 15 über solche Ausdrücke, wie unser Integral ist, muß die Variation des Integrals verschwinden, wenn dasselbe ein Maximum oder Minimum wird. Die Variation des Integrals kann nach dem Resultate der vorigen Aufgabe so umgeformt werden, daß sie in ein Integral und in einen vom Integralzeichen freien Ausdruck zerfällt. Nur hat man noch unter das Integralzeichen einen Ausdruck zu setzen, der ebenso aus ϕ für z gebildet ist, wie das obige ϕ für y ; derselbe ist sodann mit $\delta z - \frac{dz}{dx} \delta x$ zu multipliciren, das mit E bezeichnet werde. Ebenso ist der zweite Theil des obigen Resultates um einen analogen Ausdruck für z und E zu vermehren. Da nun das totale Integral wegen der darin vorkommenden beliebigen Variationen Δ und E nicht integrel ist, die Variation aber 0 gesetzt werden muß; so ist die Function unter dem Integralzeichen für sich und ebenso der von demselben freie Ausdruck gleich Null zu setzen, indem man in letzteren die den Integralgränzen entsprechenden Werthe der Variablen und ihrer Differenzialquotienten einführt. Man erhält also zwei Gleichungen:

$$\begin{aligned} (1) \quad 0 &= \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial y'} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial \phi}{\partial y''} \mp \dots \right) \Delta + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial z'} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial \phi}{\partial z''} \mp \dots \right) E \\ (2) \quad 0 &= \phi \delta x + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial y''} \pm \dots \right) \Delta + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y''} \mp \dots \right) \frac{d\Delta}{dx} + \dots \\ &\quad + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z'} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial z''} \pm \dots \right) E + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z''} \pm \dots \right) \frac{dE}{dx} + \dots \end{aligned}$$

Die Gleichung (1) findet zum Unterschied von (2) für jeden Werth der Variablen statt: man erhält daher durch sie wenigstens eine Differenzialgleichung zwischen x, y, z . Existirt für die Aufgabe weiter keine Bedingung zwischen diesen Variablen, so sind die Variationen Δ und E völlig unabhän-

gig von einander, und es kann (1) nur erfüllt werden, wenn die mehrgliedrigen Coefficienten von Δ und E einzeln gleich 0 gesetzt werden. Im Allgemeinen wird man dann so viel Differenzialgleichungen erhalten, als Variablen vorhanden sind, welche von x abhängen: durch sie findet man die Formen der einzelnen Functionen. — Aus (2) ergeben sich Gränzbedingungen, welche über die Werthe der Functionen an den Gränzen des Integrals Aufschluss geben. Sind diese Gränzen so fixirt, daß x, y, z gegebene Werthe haben, so verschwinden Δ und E , denn die Variationen von Constanten sind Null: (2) wird daher alsdann von selbst erfüllt. Verbinden sich aber mit (2) noch andre durch das Problem gegebene Relationen zwischen den Variationen, so reducirt man dieselben durch Elimination auf die kleinste Anzahl, und setzt die Coefficienten der übrig bleibenden Variationen gleich Null. Aus diesen Gleichungen kann sodann die Bestimmung der willkürlichen Constanten gewonnen werden, die durch Integration der Gleichungen (1) in die Relationen der Variablen aufgenommen sind. — Wenn aber n Relationen zwischen den Variablen für die ganze Ausdehnung des Integrals oder für die Gränzen desselben gegeben sind, so werden die dadurch entstehenden Veränderungen der obigen Gleichungen durch eine der beiden folgenden Aufgaben gefunden. Man hat dabei vorauszusetzen, daß die Anzahl der Variablen in ϕ beliebig, und zwar größer als $n + 1$ sei, wodurch die Gleichungen (1) und (2) nur um analoge Glieder vermehrt werden.

Aufgabe III.

Die Veränderungen zu finden, welche in den Gleichungen (1) und (2) vorzunehmen sind, wenn die Variablen für die ganze Ausdehnung des Integrals durch n Bedingungsgleichungen verbunden sind.

Auflösung. Es muß zuerst an einen Hilfssatz aus der Theorie der Elimination erinnert werden. Nimmt man eine Gleichung ersten Grades zwischen m Größen an von der Form

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0,$$

welche für alle beliebigen Werthe der x_1, x_2, \dots, x_n erfüllt werden muß; sind diese außerdem durch p Gleichungen verbunden:

$$b_{11} x_1 + b_{12} x_2 + \dots + b_{1n} x_n = 0,$$

$$b_{21} x_1 + b_{22} x_2 + \dots + b_{2n} x_n = 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$b_{p1} x_1 + b_{p2} x_2 + \dots + b_{pn} x_n = 0,$$

wo $p < m - 1$ ist, und einige der Coefficienten b verschwinden können; so wird man die $x_1, x_2, \dots x_n$ eliminiren und nach vollbrachter Reduction die Coefficienten der übrigen Größen x gleich Null setzen. Statt dieses meist langwierigen Verfahrens kann man jede der p Bedingungsgleichungen mit einem beliebigen Factor $\alpha, \beta, \dots \pi$ multipliciren und zur ursprünglichen Gleichung addiren, wodurch man das Resultat erhält

$$0 = (a_1 + \alpha b_{1,1} + \beta b_{1,2} + \dots + \pi b_{1,p})x_1 + (a_2 + \alpha b_{2,1} + \beta b_{2,2} + \dots + \pi b_{2,p})x_2 + \dots + (a_n + \alpha b_{n,1} + \beta b_{n,2} + \dots + \pi b_{n,p})x_n.$$

Löst man nun die Coefficienten der x einzeln verschwinden, und eliminirt die $\alpha, \beta, \dots \pi$, deren Anzahl p wenigstens um 2 kleiner als m ist; so erhält man dieselben Gleichungen zwischen den Coefficienten a und b , wie vorhin bei directer Elimination der Größen x . —

Um die vorgelegte Aufgabe zu lösen unterscheidet man zwei Fälle, indem der erste einfachere zur schnelleren Erledigung des zweiten führt.

Erster Fall: Die n Bedingungsgleichungen zwischen den Variablen des Ausdrucks ϕ enthalten nur diese Variablen selbst. Sie werden bezeichnet mit

$$\psi_1(x, y, z, \dots) = 0, \psi_2(x, y, z, \dots) = 0, \dots \psi_n(x, y, z, \dots) = 0.$$

Diese Gleichungen müssen für alle Werthe der Variablen, also auch für die durch Variationen veränderten erfüllt werden. Bildet man von jeder das totale Differenzial, indem man x als unabhängige Variable, y und $z \dots$ als deren Functionen betrachtet; eben so von jeder die vollständige Variation, wobei die einzelnen Variationen als völlig unabhängig von einander vorausgesetzt werden; so müssen beide entstandenen Ausdrücke verschwinden. Man multiplicire das Differenzial mit δx und subtrahire es von der Variation, so erhält man n Gleichungen

$$(3) \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Delta + \frac{\partial \psi_1}{\partial z} E + \dots = 0, \dots \frac{\partial \psi_n}{\partial y} \Delta + \frac{\partial \psi_n}{\partial z} E + \dots = 0.$$

Da jede die Variationen Δ, E, \dots enthält, welche sich auch in der verallgemeinerten Gleichung (1) finden, so kann man auf dieses System von Gleichungen den Hülfsatz anwenden. Bezeichnen $\lambda, \dots v$ die unbestimmten Factoren der n Gleichungen (3), werden die Producte zur linken Seite der (1) addirt, die Coefficienten der Δ , der E, \dots vereinigt und alsdann gleich 0 gesetzt; so resultiren so viel Gleichungen, als Variablen $y, z \dots$ in ϕ enthalten sind, von der Form:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial y'} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial \phi}{\partial y''} \mp \dots + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \dots + \nu \frac{\partial \psi_s}{\partial y} = 0.$$

Aus diesen Gleichungen sind die Factoren λ, \dots, ν zu eliminiren; die dadurch gewonnenen Differenzialgleichungen bestimmen die Formen der einzelnen Functionen. Die Gleichung (2) wird durch die Einführung solcher Bedingungsgleichungen nicht verändert.

Zweiter Fall: Die n Bedingungsgleichungen enthalten außer den Variablen des Ausdrucks ϕ auch deren Differenzialquotienten nach x ; sie seien bezeichnet durch

$$\psi_1(x, y, y', y'', \dots, x, x', \dots) = 0, \dots, \psi_s(x, y, y', y'', \dots, x, x', \dots) = 0.$$

Auch hier bilde man das totale Differenzial eines jeden ψ nach x , und setze in der vollständigen Variation desselben statt $\delta y^{(n)}$, $\delta x^{(n)}$ die in Satz II gefundenen Werthe, indem man sich der Zeichen Δ, E, \dots bedient. Nachdem man die Producte der Differenziale mit δx von den Variationen subtrahirt, erhält man n Gleichungen von der Form:

$$0 = \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \Delta + \frac{\partial \psi_1}{\partial y'} \frac{d\Delta}{dx} + \frac{\partial \psi_1}{\partial y''} \frac{d^2\Delta}{dx^2} + \dots + \frac{\partial \psi_1}{\partial x} E + \frac{\partial \psi_1}{\partial x'} \frac{dE}{dx} + \dots$$

Multiplirt man jede derselben mit dx und einem Factor λ, \dots, ν , so wird auch das Integral eines jeden dieser Producte verschwinden; diese Integralgleichungen finden für alle beliebigen Werthe von Δ, E, \dots statt, so daß man dieselben zu $\int(\delta\phi \cdot dx - d\phi \cdot \delta x)$, wie dies in der Aufgabe I erscheint, addiren kann. Es ergibt sich daher eine Gleichung von folgender Gestalt:

$$0 = \int \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \dots + \nu \frac{\partial \psi_s}{\partial y} \right) \Delta dx + \int \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial y'} + \dots \right) \frac{d\Delta}{dx} dx + \dots \\ + \int \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial x} + \dots + \nu \frac{\partial \psi_s}{\partial x} \right) E dx + \int \left(\frac{\partial \phi}{\partial x'} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial x'} + \dots \right) \frac{dE}{dx} dx + \dots$$

Nimmt man mit der rechten Seite dieser Gleichung dieselben Umformungen wie in Aufgabe I vor, so resultirt erstlich die Integralgleichung:

$$0 = \int \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial y} + \dots + \nu \frac{\partial \psi_s}{\partial y} \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial y'} + \dots \right) + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y''} + \dots \right) \mp \dots \right] \Delta dx \\ + \int \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial x} + \dots + \nu \frac{\partial \psi_s}{\partial x} \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x'} + \lambda \frac{\partial \psi_1}{\partial x'} + \dots \right) + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x''} + \dots \right) \mp \dots \right] E dx + \dots$$

Da in dieser Gleichung die Coefficienten von Δ, E, \dots gleich 0 zu setzen sind, so erhält man die Differenzialgleichungen, welche nach Elimination von λ, \dots, ν die gesuchten Relationen zwischen den Variablen geben.

Sodann verändert sich die Gleichung (2) in Folge der vorgenommenen partiellen Integrationen, so daß sie nunmehr erscheint als

$$\begin{aligned} & \phi \delta x + \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial \psi}{\partial y'} + \dots \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y''} + \dots \right) \pm \dots \right] \Delta \\ & + \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial y''} + \lambda \frac{\partial \psi}{\partial y''} + \dots \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y'''} + \dots \right) \pm \dots \right] \frac{d\Delta}{dx} + \dots \\ & + \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x'} + \lambda \frac{\partial \psi}{\partial x'} + \dots \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x''} + \dots \right) \pm \dots \right] E \\ & + \left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x''} + \lambda \frac{\partial \psi}{\partial x''} + \dots \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x'''} + \dots \right) \pm \dots \right] \frac{dE}{dx} + \dots \end{aligned}$$

In diese Gleichung hat man für $\lambda, \dots v$ die gefundenen Werthe zu substituiren, die den Integralgränzen entsprechenden Werthe der Variablen einzusetzen, und, wenn alsdann keine andern Bedingungen für die Gränzwerte der Variationen $\delta x, \Delta, E \dots$ und ihrer Differenzialquotienten $\frac{d\Delta}{dx}, \frac{dE}{dx}, \dots$ existiren, die Coefficienten dieser Gröſsen einzeln verschwinden zu lassen. Die Benutzung dieser Gleichungen zur Bestimmung der willkürlichen Constanten, welche sich in den Ausdrücken für $y, z \dots$ finden, ist schon oben erwähnt worden.

Anmerkung. Besteht das zu einem Maximum oder Minimum zu machende Integral nur aus einer Variablen $\phi = \frac{d\psi}{dx}$, und hängt y mit den andern Variablen und deren Differenzialquotienten durch eine Bedingungsgleichung zusammen; so ergibt sich unmittelbar

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y'} = 1, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y''} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial x'} = 0, \dots$$

Daher wird die Gleichung (1) hier

$$\left[\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y'} \right) \pm \dots \right] \Delta + \left[\lambda \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{\partial \psi}{\partial x'} \right) \pm \dots \right] E + \dots = 0.$$

Hier setzt man die Coefficienten von Δ, E, \dots gleich 0, eliminirt den Factor λ , und findet durch Verbindung der resultirenden Gleichungen mit der Bedingungsgleichung die Relationen zwischen den Variablen. Wenn in ψ kein höherer Differenzialquotient von y als der n^{te} vorkommt, so wird λn willkürliche Constanten enthalten, da die obigen Differenzialgleichungen in Bezug auf λ linear und von n^{ter} Ordnung sind. Diese Constanten kann man zur Erfüllung von n Gleichungen für die eine Gränze des Integrals benutzen. Die Gleichungen reduciren sich aber, auſſer der ersten

$$1 + \lambda \frac{\partial \psi}{\partial y'} - \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y''} \right) + \dots \pm \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left(\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y^{(n)}} \right) = 0,$$

sämmtlich auf die Form:

$$\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y''} - \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y'''} \right) + \dots \pm \frac{d^{n-2}}{dx^{n-2}} \left(\lambda \frac{\partial \psi}{\partial y^{(n)}} \right) = 0,$$

so daß die letzte ist

$$\lambda \frac{\partial \psi}{\partial f^{(n)}} = 0.$$

Sie werden erfüllt, wenn man für die eine gegebene Gränze des Integrals setzt:

$$\lambda = 0, \quad \frac{d\lambda}{dx} = 0, \quad \dots \quad \frac{d^{n-1}\lambda}{dx^{n-1}} = 0, \quad \frac{d^{n-1}\lambda}{dx^{n-1}} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial f^{(n-1)}} + 1 = 0.$$

Da hiernach für den Gränzwert x , die letzte Gleichung stattfindet, so kann man den allgemeinen Werth von $\frac{d^{n-1}\lambda}{dx^{n-1}}$ durch folgende Gleichung bestimmen:

$$\frac{d^{n-1}\lambda}{dx^{n-1}} \cdot \left(\frac{\partial \psi}{\partial f^{(n-1)}} \right)_1 + x - x_1 + 1 = 0,$$

deren Differenzial dann die schon von Lagrange gegebene Form hat

$$\frac{d^2\lambda}{dx^2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial f^{(n-1)}} \right)_1 + 1 = 0.$$

Dritter Fall. Sind als Bedingungen für die Variablen n Integrale gegeben, welche innerhalb der gegebenen Gränzen gewisse Werthe behalten sollen,

$$\int f_1 dx, \dots \int f_n dx,$$

wie dies für $n = 1$ der Fall bei den isoperimetrischen Problemen ist, und sind deren unbestimmte Werthe F_1, \dots, F_n , wo F_1, F_n noch unbekannte Functionen von x bezeichnen; so können als Bedingungsgleichungen angesehen werden:

$$F_1 - \int f_1 dx = 0, \dots F_n - \int f_n dx = 0,$$

oder auch

$$dF_1 - f_1 dx = 0, \dots dF_n - f_n dx = 0.$$

Da diese Gleichungen für alle Werthe der Variablen erfüllt sein sollen, so müssen auch die Variationen verschwinden, d. h. $\delta(dF_1) - \delta(f_1 dx) = 0, \dots$ Multiplicirt man diese Gleichungen mit λ, \dots, ν , und addirt die Integrale dieser Producte zu $\int \delta(\phi dx)$; beachtet man ferner daß

$$\int \lambda \delta dF_1 = \int \lambda \delta f_1 dx = \lambda \delta F_1 - \int \frac{d\lambda}{dx} dx \delta F_1;$$

so bleibt unter dem Integralzeichen nur je ein Glied, welches mit der Variation eines F behaftet ist. Da diese Variationen, als solche von noch unbekannten Functionen, unabhängig von denen der andern Variablen sind, so müssen die Glieder, welche sie enthalten, gleich 0 werden, d. h. die Factoren dieser Variationen müssen verschwinden. Letztere sind aber die totalen Differenzialquotienten der Factoren λ nach x , daher sind λ, \dots, ν von x unabhängige Größen oder Constanten a, \dots, h . Unter dem Integralzeichen bleiben daher nur die Variationen der zu integrierenden Ausdrücke

$f dx$, multiplicirt mit constanten Factoren. — Die Glieder $\lambda \delta F$ aber, welche zur Gleichung (2) gehören würden, verschwinden ebenfalls; denn da die F , zwischen den Gränzen des Integrals genommen, constante Werthe haben, so müssen die Variationen dieser Werthe, oder die Differenzen der Variationen von F an den beiden Gränzen verschwinden. Also rühren alle Veränderungen, welche (1) und (2) erleiden, nur von den Variationen der $f dx$ her; (1) geht daher über in die Gleichungen

$$\frac{\partial \phi}{\partial f} + a \frac{\partial f_1}{\partial f} + \dots + h \frac{\partial f_n}{\partial f} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \phi}{\partial f'} + a \frac{\partial f_1}{\partial f'} + \dots \right) \pm \dots = 0, \text{ etc.}$$

Die Gleichung (2) aber wird:

$$(\phi + a f_1 + \dots + h f_n) \delta x + \left(\frac{\partial \phi}{\partial f} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial f'} \pm \dots + a \frac{\partial f_1}{\partial f} - a \frac{d}{dx} \frac{\partial f_1}{\partial f'} \pm \dots + h \frac{\partial f_n}{\partial f} \mp \dots \right) \Delta + \dots = 0.$$

Aufgabe IV.

Die Veränderungen der Gränzgleichung (2) zu bestimmen, wenn zwischen den Variablen für die Gränzwerte des Integrals n Bedingungsgleichungen stattfinden.

Auflösung. Bezeichnet man die Gränzwerte von x mit x_0 und x_1 , und die denselben entsprechenden Werthe der übrigen Variablen und ihrer Differenzialquotienten mit $y_0, y_1, y'_0, y'_1, y''_0, y''_1, \dots, z_0, z_1, z'_0, z'_1, \dots$, so seien die Gränzgleichungen von der Form

$$\chi(x_0, x_1, y_0, y_1, y'_0, y'_1, \dots, y''_0, y''_1, \dots, z_0, z_1, z'_0, z'_1, \dots) = 0.$$

Da diese Gleichungen für alle Gränzwerte der Variablen erfüllt sein müssen, so auch für die durch Variationen vermehrten: daher werden die Variationen der χ verschwinden, so daß

$$\frac{\partial \chi}{\partial x_0} \delta x_0 + \frac{\partial \chi}{\partial x_1} \delta x_1 + \frac{\partial \chi}{\partial y_0} \delta y_0 + \frac{\partial \chi}{\partial y_1} \delta y_1 + \frac{\partial \chi}{\partial y'_0} \delta y'_0 + \dots + \frac{\partial \chi}{\partial y'_1} \delta y'_1 + \dots + \frac{\partial \chi}{\partial z_0} \delta z_0 + \frac{\partial \chi}{\partial z_1} \delta z_1 + \dots = 0.$$

Statt die einzelnen Variationen zwischen diesen Gleichungen und der Gleichung (2) zu eliminiren, multiplicirt man wiederum die zuletzt erhaltenen mit unbestimmten Factoren α, β, \dots , addirt die Producte zu (2) und setzt die Coefficienten aller einzelnen Variationen gleich 0. Nach der Elimination von α, β, \dots hat man die noch übrig bleibenden Gleichungen vermittelst der willkürlichen Constanten zu erfüllen, welche durch die Integration der Differenzialgleichungen (1) in die Ausdrücke für y, z, \dots übergegangen sind. Hierbei aber ist zu bemerken, daß einige dieser Variationen sich als Func-

tionen anderer ausdrücken lassen. Ist nämlich eine der Variablen in den Differenzialgleichungen so. enthalten, daß ihr höchster Differenzialquotient von der m^{ten} Ordnung ist, so enthält die Variable selbst m willkürliche Constanten, oder die Variable selbst und ihre $m - 1$ ersten Differenzialquotienten sind für einen gegebenen Werth von x willkürlich zu bestimmen. Findet dies für $x = x_0$ statt, so daß dadurch den Bedingungen der Aufgabe genügt wird, so können diese Gränzwerte der Variablen u. s. w. als gegebene Functionen der andern Variablen u. s. w. betrachten, eben so auch ihre Variationen als abhängig von den übrigen Variationen. Die m arbiträren Constanten sind hierdurch bestimmt, und man hat daher die dem Gränzwerte x_0 entsprechenden Variationen jener Variablen u. s. w. als unabhängige zu behandeln.

Aufgabe V.

Die Unterscheidungszeichen der Maxima und Minima zu finden.

Auflösung. Es ist schon pag. 15 bemerkt, ein Ausdruck sei ein Maximum, wenn seine zweite Variation ein negatives Vorzeichen habe. Wird also die durch Gleichung (1) gefundene Form von y in die zweite Variation des gegebenen Integrales substituirt, so muß diese beständig negativ oder beständig positiv sein, wenn das Integral ein Maximum oder ein Minimum haben soll. Nimmt man der kürzern Rechnung wegen an, daß von y nur der erste Differenzialquotient in ϕ vorkommt, so ist die erste Variation von $\int \phi dx$ folgende

$$\int \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \Delta + \frac{\partial \phi}{\partial y'} \frac{d\Delta}{dx} \right) dx;$$

diese variirt giebt die zweite Variation:

$$\int dx \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \Delta^2 + 2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'} \Delta \frac{d\Delta}{dx} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} \frac{d\Delta^2}{dx^2} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \delta\Delta + \frac{\partial \phi}{\partial y'} \frac{d\delta\Delta}{dx} \right).$$

Integriert man das letzte Glied theilweise, so bleibt unter dem Integralzeichen statt der beiden letzten Glieder

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \phi}{\partial y'} \right) \delta\Delta,$$

wovon der erste Factor in Folge der für y schon erfüllten Gleichung (1) verschwindet; daher ist die Bedingung folgende:

$$\int dx \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \Delta^2 + 2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'} \Delta \frac{d\Delta}{dx} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} \frac{d\Delta^2}{dx^2} \right)$$

mufs innerhalb der gegebenen Gränzen für ein stattfindendes Maximum stets negativ, für ein Minimum stets positiv sein, so klein auch Δ sein mag. Es findet daher ein Minimum auch dann statt, wenn der Werth des Trinoms unter dem Integralzeichen von der untern Gränze $x = x_0$ bis zur obern $x = x_1$ beständig positiv ist; ein Maximum dagegen, wenn während dieses ganzen Intervalles das Trinom das negative Vorzeichen behält. Beide Bedingungen vereinigen sich in der, dafs das Trinom nicht vom Positiven zum Negativen übergehe. Bezeichnet man $\frac{d\Delta}{dx}$ mit Δ' , und den Theil des Trinoms, der stets ein und dasselbe Vorzeichen behält, mit

$$(a) \quad M\Delta^2 + 2N\Delta\Delta' + P\Delta'^2.$$

Bringt man diesen auf die Form

$$P\Delta^2 \left(\frac{\Delta'^2}{\Delta^2} + 2\frac{\Delta'}{\Delta} \frac{N}{P} + \frac{M}{P} \right),$$

so ist zunächst das Vorzeichen von $P\Delta^2$ d. h. von P zu bestimmen. Damit für alle beliebigen Werthe von $\frac{\Delta'}{\Delta}$ der in Klammern eingeschlossene Ausdruck stets positiv bleibe, wie es für sehr grofse Werthe jenes Quotienten der Fall ist, ist zu verhüten, dafs derselbe vom Positiven durch 0 zum Negativen übergehe. Diese Bedingung wird ausgedrückt durch $N^2 - MP \leq 0$; dann ist (a) positiv und negativ zugleich mit P . Aus der Untersuchung der Gröfsen M, N, P in jedem einzelnen Falle ergibt sich das Verhalten des Ausdrucks, falls derselbe unendlich werden sollte.

Der vom Trinom übrig bleibende Theil ist

$$(b) \quad \Delta^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} - M \right) + 2\Delta\Delta' \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'} - N \right) + \Delta'^2 \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} - P \right);$$

sein Integral sei $\kappa + \lambda\Delta + \mu\Delta^2$, woraus man findet

$$\mu = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'} - N, \quad \frac{d\mu}{dx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} - M, \quad \lambda = 0, \quad \frac{d\kappa}{dx} = 0.$$

Letztere zwei Gleichungen ergeben, dafs $\lambda\Delta$ aus dem Integral verschwindet, und κ eine Constante ist. Da das Glied, welches $P - \frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2}$ entspricht, im differenzirten Integrale fehlt, so erhält man den Werth von P gleich $\frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2}$. Das Integral $\kappa + \mu\Delta^2$ ist, in Bezug auf die beiden Gränzen x_0, x_1 genommen, nur abhängig von μ , und μ_0 ; $\Delta^2(\mu, -\mu_0)$ ist aber

positiv, wenn für $x = x_0$, $\mu \leq 0$; für $x = x_1$, $\mu \geq 0$;

negativ,, $\mu \geq 0$,, $\mu \leq 0$.

Es kommt also bei der Unterscheidung zwischen Maxima und Minima einmal auf das Vorzeichen von $\frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2}$ an, alsdann auf die Werthe von μ . Diese

Gröfse ist durch die Bedingung bestimmt: $N^* - MP \leq 0$, welche nach Einsetzung der oben gefundenen Werthe folgende Differenzialgleichung ergibt:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2} - \frac{\partial \mu}{\partial x} \right) \geq \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'} - \mu \right)^2.$$

Läfst man der Einfachheit wegen nur das Gleichheitszeichen gelten, so ist doch die allgemeine Auffindung von μ , eine Aufgabe der Theorie der Differenzialgleichungen, erst Jacobi gelungen (Crelle XVII). Dieser bestimmte μ durch die partiellen Differenziale von y selbst auf folgende Weise. Enthält y nach der Integration der Gleichung (1) zwei willkürliche Constanten a und b , und setzt man $v = a \frac{\partial y}{\partial a} + b \frac{\partial y}{\partial b}$, wo a und b zwei neue Constanten bezeichnen, so wird $\mu = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y'} + \frac{1}{v} \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y'^2}$. Dieser Satz ist schon im sechsten Bande des Liouville'schen Journals bewiesen worden; jedoch kann die Herleitung und die Verallgemeinerung des Satzes aus so fruchtbaren und umfassenden Betrachtungen von Differenzialgleichungen gewonnen werden, daß wir diese schicklicher an einem andern Orte zu geben gedenken.

Aufgabe VI.

Wenn in dem Doppel-Integral

$$\iint dx dy \cdot \phi \left(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)$$

z eine unbekannte Function von x und y , $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$... die partiellen Differenzialquotienten von z nach x und y bezeichnen, so ist die analytische Relation zwischen diesen Gröfsen zu finden, welche ausdrückt, daß jedes Integral zwischen gegebenen Gränzen einen größten oder kleinsten Werth habe.

Auflösung. Die Variation des Integrals muß auch hier verschwinden; durch zweimalige Anwendung des Satzes III wird aber die Variation auf den zu integrierenden Ausdruck $\phi dx dy$ übertragen. Da nun $\delta(\phi dx dy) = \delta\phi \cdot dx dy + d\delta x \cdot \phi dy + d\delta y \cdot \phi dx$, und

$$\int d\delta x \cdot \phi dy = \delta x \cdot \phi dy - \int \frac{d\phi}{dx} \delta x dx dy, \int d\delta y \cdot \phi dx = \delta y \cdot \phi dx - \int \frac{d\phi}{dy} \delta y dy dx,$$

so ist die Gleichung für die totale Variation:

$$0 = \int \phi \delta x \cdot dy + \int \phi \delta y \cdot dx + \iint \left(\delta\phi - \frac{d\phi}{dx} \delta x - \frac{d\phi}{dy} \delta y \right) dx dy.$$

Was zuerst das vorhandene Doppel-Integral betrifft, so ist die abhängige Variation $\delta\phi$ in der Weise zu bilden, daß außer x und y auch z und für's Erste dessen partielle Differentiale unabhängige Variationen erhalten. Für das totale Differential $\frac{d\phi}{dx}$ sind nicht nur z , $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, sondern auch $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ als implicite Functionen von x zu betrachten; dasselbe gilt in entsprechender Weise für $\frac{d\phi}{dy}$. Bezeichnet man ferner die partiellen Differentialquotienten von ϕ nach $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, ... mit $\frac{\partial \phi}{\partial(z, x)}$, $\frac{\partial \phi}{\partial(z, x^2)}$, $\frac{\partial \phi}{\partial(z, xy)}$..., so erhält man als Function unter dem doppelten Integralzeichen

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \left(\delta z - \frac{\partial z}{\partial x} \delta x - \frac{\partial z}{\partial y} \delta y \right) + \frac{\partial \phi}{\partial(z, x)} \left(\delta \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \delta x - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \delta y \right) \\ & + \frac{\partial \phi}{\partial(z, y)} \left(\delta \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \delta x - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \delta y \right) + \frac{\partial \phi}{\partial(z, x^2)} \left(\delta \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} \delta x - \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} \delta y \right) + \dots \end{aligned}$$

Der Factor von $\frac{\partial \phi}{\partial z}$ hat eine Form, welche ähnlich wie in den früheren Aufgaben Δ , E gebildet ist; bezeichnen wir ihn mit Z , so sind die Factoren der übrigen Differentiale auf Z zurückzuführen.

Um zuerst die Variation von $\frac{\partial z}{\partial x}$ zu bilden, betrachte man den Zuwachs, den z erhält, wenn y als constant angesehen wird: er besteht in $\frac{\partial z}{\partial x} dx$; variirt man den um dieses partielle Differential vermehrten Werth, so führt dies zu einer neuen Function z . Andererseits ist zu $z + \delta z$ das Increment zu addiren, welches den auf $z + \delta z$ folgenden Werth eben dieser neuen Function bestimmt: die Differentiation kann nur nach x geschehen, so daß

$$z + \frac{\partial z}{\partial x} dx + \delta \left(z + \frac{\partial z}{\partial x} dx \right) = z + \delta z + \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial \delta z}{\partial x} dx.$$

Im partiellen Differential wird dx als ein invariabler Factor betrachtet; daher giebt die eben erhaltene Gleichung

$$\delta \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial \delta z}{\partial x}.$$

Da nun $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \delta x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \delta x \right)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \delta y = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \delta y \right)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \delta x = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \delta x \right)$, wo man der Allgemeinheit wegen δx , δy nicht differenzirt, so sind die Factoren der partiellen Differentiale von ϕ in obigem Ausdruck außer dem ersten $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, ..., und dieser Ausdruck selbst

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} Z + \frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} \frac{\partial Z}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} \frac{\partial Z}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2)} \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)} \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2}.$$

Bei der Transformation desselben darf unter dem doppelten Integralzeichen nur ein Product von Z bleiben; der andre Theil wird daher aus einem oder aus beiden Integralen heraustreten. Setzt man daher den totalen Ausdruck gleich

$$\phi \cdot Z + \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y},$$

so werden ξ, η noch mit einem der ersten partiellen Differenzialquotienten behaftet sein. Sei

$$\xi = \rho_0 Z + \rho, \quad \eta = \sigma_0 Z + \sigma, \quad \zeta = \tau Z.$$

Durch Vergleichung der mit z oder dessen Differenzialen behafteten Glieder, erhält man

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial x} &= \phi - \frac{\partial \rho_0}{\partial x} - \frac{\partial \sigma_0}{\partial y} - \frac{\partial^2 \tau}{\partial x \partial y}, \\ \frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} &= \rho_0 + \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial \tau}{\partial y}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} = \sigma_0 + \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \tau}{\partial x}, \\ \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2)} &= \rho, \quad \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)} = \tau, \quad \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} = \tau. \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich unmittelbar

$$\begin{aligned} \rho_0 &= \frac{\partial \phi}{\partial (x, x)} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2)} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)}, \quad \sigma_0 = \frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)}, \\ \phi &= \frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial (x, x)} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2)} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)}. \end{aligned}$$

Hier ist ϕ der unter dem doppelten Integralzeichen stehende Ausdruck; dagegen tritt $\frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)}$ aus demselben gänzlich heraus; $\rho_0 Z + \rho, \frac{\partial Z}{\partial x}$, aus den eben gefundenen Gleichungen für ρ_0 und ρ , zusammengesetzt, steht unter dem auf $y, \sigma_0 Z + \sigma, \frac{\partial Z}{\partial y}$ unter dem auf x sich beziehenden Integralzeichen. Demnach wird der nur einer Integration unterworfen Theil der gesamten Variation folgende Gestalt haben:

$$(2) \int dx \left[\phi \partial y + \left(\frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} \right) Z + \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} \frac{\partial Z}{\partial y} \right] + \int dy \left[\phi \partial x + \left(\frac{\partial \phi}{\partial (x, x)} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2)} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial (x, xy)} \right) Z + \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2)} \frac{\partial Z}{\partial x} \right].$$

Setzt man, um die Variation verschwinden zu lassen, zuerst Φ gleich 0, so gewinnt man eine partielle Differenzialgleichung, aus welcher z zu bestimmen ist. In (2) hat man den Factor von dx für die Gränzwerte des auf y bezüglichen Integrals, den von dy für die des auf x bezüglichen Integrals einzurichten. — Wendet man hierauf geometrische Vorstellungen an, so hat man Probleme über Flächen hierher zu rechnen: $\Phi = 0$ muß dann für die ganze Ausdehnung der Flächen erfüllt werden. Da die Begrenzung derselben durch Curven geschieht, so muß (2) = 0 für die Punkte dieser Gränzcurven stattfinden. Für die Discussion von (2) = 0 gelten die Bemerkungen über Elimination von Variationen, wie sie schon für Aufgaben mit einfachen Integralen aufgestellt sind. Ist die Gränzcurve völlig bestimmt und unveränderlich, so verschwinden die Variationen der Gränzgleichung von selbst.

Anmerkung 1. Man kann zu dieser Aufgabe Bedingungsgleichungen hinzufügen, welche die Resultate mehr oder weniger complicirt machen (s. Aufg. III und IV). Hier soll nur noch die dem isoperimetrischen Problem analoge Aufgabe erörtert werden. Ist nämlich die Bedingung für das Maximum oder Minimum des Integrals gegeben, daß ein neues Doppel-Integral

$$\iint f(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \dots) dx dy$$

für die gegebenen Gränzen einen constanten Werth haben soll, so kann dieselbe auch durch die Gleichung ausgedrückt werden $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} - f = 0$, wo F das unbestimmte doppelte Integral von f ist. Multiplicirt man die ebenfalls verschwindende Variation der linken Seite dieser Gleichung mit einem unbestimmten Factor ω , so ist das Doppel-Integral dieses Productes zur Variation des ursprünglichen Integrals zu addiren. Hier aber findet sich nach Ausführung partieller Integrationen nur ein Glied unter dem doppelten Integralzeichen, welches die unabhängige Variation δF enthält. Da demnach der Factor von δF , $\frac{\partial^2 \omega}{\partial x \partial y}$, verschwinden muß, so ist leicht zu sehen, daß die Variablen x und y in ω von einander getrennt sind, also $\omega = \psi_1(x) + \psi_2(y)$. Besteht $f(x, \dots)$ nur in z selbst, d. h. soll das Volumen einer Fläche, deren Gränzen durch die des Integrales bestimmt sind, einen constanten Werth haben, so tritt zu dem Ausdruck Φ nur noch das Glied $-\omega$ hinzu.

Anmerkung 2. Die hier angewandte Methode zur Auffindung der

unter dem doppelten, unter den einfachen Integralzeichen stehenden, und der von denselben freien Ausdrücke, liefert bestimmte Resultate auch für den Fall, daß in dem Integrales Ausdruck sämtliche partielle Differenzialquotienten von z bis zu denen der n^{ten} Ordnung vorkommen.

Nach geschehener Variation kann der Ausdruck unter dem Integralzeichen auf die Form gebracht werden:

$$(A) \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} Z + \frac{\partial \phi}{\partial(z, x)} \frac{\partial Z}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial(z, y)} \frac{\partial Z}{\partial y} + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial(z, x^s)} \frac{\partial^s Z}{\partial x^s} \\ + \frac{\partial \phi}{\partial(z, x^{s-1} y)} \frac{\partial^{s-1} Z}{\partial x^{s-1} \partial y} + \dots + \frac{\partial \phi}{\partial(z, x y^{s-1})} \frac{\partial^{s-1} Z}{\partial x \partial y^{s-1}} + \frac{\partial \phi}{\partial(z, y^s)} \frac{\partial^s Z}{\partial y^s}.$$

Für diesen hat man wie vorhin zu setzen

$$\phi \cdot Z + \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y}.$$

Bezeichnen $\rho_0, \rho_1, \dots, \sigma_0, \sigma_1, \dots, \tau_0, \tau_{10}, \tau_{11}, \dots$ noch unbekannte Functionen, so werden die Größen ξ, η, ζ durch folgende Gleichungen dargestellt:

$$\xi = \rho_0 Z + \rho_1 \frac{\partial Z}{\partial x} + \rho_2 \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \dots + \rho_{s-1} \frac{\partial^{s-1} Z}{\partial x^{s-1}}, \\ \eta = \sigma_0 Z + \sigma_1 \frac{\partial Z}{\partial y} + \sigma_2 \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} + \dots + \sigma_{s-1} \frac{\partial^{s-1} Z}{\partial y^{s-1}}, \\ \zeta = \tau_0 Z + \tau_{10} \frac{\partial Z}{\partial x} + \tau_{11} \frac{\partial Z}{\partial y} + \tau_{20} \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + \tau_{21} \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y} + \dots \\ + \tau_{s-2,0} \frac{\partial^{s-2} Z}{\partial x^{s-2}} + \tau_{s-2,1} \frac{\partial^{s-2} Z}{\partial x^{s-2} \partial y} + \dots + \tau_{s-2,s-2} \frac{\partial^{s-2} Z}{\partial y^{s-2}};$$

hier hat man zu beachten, daß in den Indices von τ der erste Theil, vor dem Komma, die Ordnung des Differenzialquotienten von Z , der zweite, nach dem Komma stehende Theil den Grad des im Nenner des Differenzialquotienten vorkommenden ∂y angiebt.

Da in $\zeta \frac{n^2 - n}{2}$ Factoren vorkommen, so hat man, incl. ϕ , überhaupt $\frac{n^2 + 3n}{2} + 1$ unbekannte Functionen, also eben so viel, als in (A) Coefficienten von Z und dessen Differenzialen vorhanden sind. Um ρ, σ, τ zu finden, muß man $\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y}$ entwickeln, und die Factoren der Differenziale von Z gleich den entsprechenden in (A) setzen. Über die aus dieser Entwicklung resultirenden Factoren ist zu bemerken: daß sie in je vier Gliedern bestehen, mit Ausnahme derjenigen, welche in die $n - 1^{\text{te}}$ Differenziale von Z multiplicirt werden und nur je drei Glieder enthalten, so wie derjenigen, welche zu den n^{ten} Differenzialen von Z gehören und nur in

je einem Glied bestehen. Der Factor von Z selbst ist

$$\phi + \frac{\partial \phi_0}{\partial x} + \frac{\partial \phi_0}{\partial y} + \frac{\partial^2 \tau_0}{\partial x \partial y};$$

die Form eines Factors von $\frac{\partial^n Z}{\partial x^n}$ ist

$$\phi_{n-1} + \frac{\partial \phi_n}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{n-1,0}}{\partial y} + \frac{\partial^2 \tau_{n-1,0}}{\partial x \partial y},$$

die eines solchen von $\frac{\partial^n Z}{\partial y^n}$ ist

$$\sigma_{n-1} + \frac{\partial \sigma_n}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{n-1,1}}{\partial x} + \frac{\partial^2 \tau_{n-1,1}}{\partial x \partial y},$$

endlich die eines Factors von $\frac{\partial^n Z}{\partial x^{n-1} \partial y}$

$$\tau_{n-1,1} + \frac{\partial \tau_{n-1,1}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{n-1,1}}{\partial y} + \frac{\partial^2 \tau_{n-1,1}}{\partial x \partial y}.$$

Eine leichte Rechnung zeigt, daß der gesammte Ausdruck, welcher die n^{te} Differenziale von Z enthält, folgender ist:

$$\frac{\partial^n Z}{\partial x^n} \phi_{n-1} + \frac{\partial^n Z}{\partial x^{n-1} \partial y} \tau_{n-1,0} + \frac{\partial^n Z}{\partial x^{n-2} \partial y^2} \tau_{n-2,1} + \dots + \frac{\partial^n Z}{\partial x \partial y^{n-1}} \tau_{n-1,n-1} \\ + \frac{\partial^n Z}{\partial y^n} \sigma_{n-1}.$$

Indem man dies mit den entsprechenden Formen des Ausdrucks A vergleicht, erhält man

$$\phi_{n-1} = \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^n)}, \sigma_{n-1} = \frac{\partial \phi}{\partial (x, y^n)}, \tau_{n-1,0} = \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^{n-1} y)}, \dots, \tau_{n-1,n-1} = \frac{\partial \phi}{\partial (x, x y^{n-1})}.$$

Aus den Differenzialen dieser Werthe nach x und y in Verbindung mit den resp. Gliedern von (A) erhält man ohne jede Rechnung sämtliche ϕ , σ , τ und endlich ϕ . Der letztere Ausdruck ist bekannt; er giebt, gleich 0 gesetzt, die Differenzialgleichung für z . Die Ausdrücke unter den nach x resp. y zu nehmenden einfachen Integralen, welche schon in Aufgabe VI angegeben sind, werden vermehrt um

$$\left(\frac{\partial^2 \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2 y)}}{\partial x^2} + \dots \right) Z + \left(- \frac{\partial \frac{\partial \phi}{\partial (x, x y^2)}}{\partial x} - \dots \right) \frac{\partial Z}{\partial y} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} + \dots \right) \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} + \dots, \\ \left(\frac{\partial^2 \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2 y)}}{\partial x^2} + \dots \right) Z + \left(- \frac{\partial \frac{\partial \phi}{\partial (x, x y^2)}}{\partial y} - \dots \right) \frac{\partial Z}{\partial x} + \dots,$$

endlich der von allen Integrationen freie Ausdruck ist

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial (x, y)} - \frac{\partial \frac{\partial \phi}{\partial (x, x^2 y)}}{\partial x} - \frac{\partial \frac{\partial \phi}{\partial (x, x y^2)}}{\partial y} + \dots \right) Z + \left(\frac{\partial \phi}{\partial (x, y^2)} - \dots \right) \frac{\partial Z}{\partial x} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial (x, y^3)} - \dots \right) \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} + \dots$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} w + \frac{\partial f}{\partial(j,x_1)} \frac{\partial w}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f}{\partial(j,x_n)} \frac{\partial w}{\partial x_n} + \dots = A w +$$

	$\frac{\partial \xi_1}{\partial x_1}, \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \xi_1}{\partial x_n}$
	$\frac{\partial \xi_2}{\partial x_1}, \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \xi_2}{\partial x_n}$
	$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$
	$\frac{\partial \xi_m}{\partial x_1}, \frac{\partial \xi_m}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \xi_m}{\partial x_n}$

$$\frac{\partial f}{\partial y} w + \frac{\partial f}{\partial(j, x_1)} \frac{\partial w}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f}{\partial(j, x_n)} \frac{\partial w}{\partial x_n} + \dots = A w +$$

	$\frac{\partial \xi_1}{\partial x_1}, \frac{\partial \xi_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \xi_1}{\partial x_n}$
	$\frac{\partial \xi_2}{\partial x_1}, \frac{\partial \xi_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \xi_2}{\partial x_n}$

	$\frac{\partial \xi_m}{\partial x_1}, \frac{\partial \xi_m}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \xi_m}{\partial x_n}$

Schulnachrichten

von Michaelis 1856 bis dahin 1857.

I. Übersicht des Lehrplans.

A. Im Winterhalbjahr.

Oberprima. Ordinarius Prof. Dr. Mützell.

Lateinisch: Horatii Carm. III, 22 bis zu Ende, IV ganz. 2 St. Hr. Dir. Meineke. Cic. de orat. I. III mit Auswahl; Aufsätze, Exercitien, Extemporalien, Übungen im Lateinisch-Sprechen. 6 St. Hr. Mützell. — Griechisch: Euripidis Medea. 2 St. Hr. Dir. Meineke. Homeri Ilias XII-XX. 2 St. Derselbe. Demosth. Oratt. Philipp. (Olynth. I. II. III u. Philipp. III). 2 St. Hr. Seyffert. — Hebräisch: Wiederholung der Formenlehre; schriftliche Übungen im Übersetzen und Analysiren; Genesis 13-19; Ps. 20-31. 2 St. Hr. Hollenberg. — Deutsch: Aufsätze und Disponirübungen; Litteraturgeschichte von 1500-1620. 3 St. Hr. Mützell. — Französisch: Phédre von Racine und L'Avare von Molière; Exercitien und Extemporalien. 2 St. Hr. Conrad. — Religion: Glaubenslehre, Art. 1 und 2 (Holl. Hilfsbuch § 158-175); Thessalonicherbriefe; Galaterbrief. 2 St. Hr. Hollenberg. — Geschichte: Alte Geschichte. 3 St. Hr. Köpke. — Mathematik: Allgemeine Repetition des gesamten Gymnasialpensums; sphärische Trigonometrie. 4 St. Hr. Conrad. — Physik: Lehre von der Wärme und Akustik. 2 St. Hr. Simon.

Unterprima. Ordinarius Prof. Dr. Seyffert.

Lateinisch: Taciti Ann. I. II; Exercitien und Extemporalien; Stil- und Disputirübungen. 6 St. Hr. Seyffert. Horat. Carm. III, 26-30; IV, 1-15. 2 St. Hr. Passow. — Griechisch: Hom. Ilias VI-XII; Thucyd. II; Syntax, Exercitien. 6 St. Hr. Passow. — Hebräisch: mit Oberprima combinirt. 2 St. Hr. Hollenberg. — Deutsch: Litteraturgeschichte vom Anfang bis zum Ende des 9ten Jahrhunderts; Aufsätze. 3 St. Hr. Kirchhoff. — Französisch: Ségur histoire de Napoléon et de la grande armée: III-VI; mündliches Übersetzen aus Fränkel's Anthologie Curs. III; Extemporalien. 2 St. Hr. Conrad. — Religion: mit Oberprima combinirt. 2 St. Hr. Hollenberg. — Geschichte: Neuere Geschichte. 3 St. Hr. Köpke. — Ma-

thematik: Schwierigere Gleichungen des 2ten Grades; Combinationslehre, binomischer Lehrsatz; allgemeine Theorie der Gleichungen; Construction der Gleichungen. 4 St. Hr. Conrad. — Physik: mit Oberprima combinirt. 2 St. Hr. Simon.

Obersecunda. Ordinarius Prof. Jacobs.

Lateinisch: Cic. orat. in Verrem IV; Liv. II mit Auswahl; Wiederholung einzelner Theile der Grammatik; mündliches Übersetzen aus Seyffert's Übungsbuch für Secunda; Exercitien und Extemporalien. 8 St. Hr. Jacobs. Virgil. Aen. IV-V, 604; Versübungen. 2 St. Hr. Seyffert. — Griechisch: Hom. Od. XIX-XXIV; Herod. VI; Syntax, Scripta. 6 St. Hr. Passow. — Hebräisch: die unregelmäßigen Verba nach Gesenius; Einübung durch mündliches und schriftliches Übersetzen; Lectüre aus Samuel I. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Deutsch: Aufsätze und mündliche Vorträge. 2 St. Hr. Köpke. — Französisch: Mélesville; La berline de Péigné; Übersetzen aus Fränkel's Anthologie, Curs. II; Extemporalien. 2 St. Hr. Conrad. — Religion: Das alte Testament; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geschichte: Das Mittelalter von Karl dem Gr. bis zu den Kreuzzügen incl. 2 St. Hr. Köpke. — Mathematik: Potenzen und Wurzeln; arithmet. und geometr. Reihen; Logarithmen und ihre Anwendung; Zinseszinsrechnung; Gleichungen des ersten und zweiten Grades. 4 St. Hr. Conrad. — Physik: Mechanik fester Körper. 2 St. Hr. Simon.

Untersecunda. Ordinarius Prof. Dr. Giesebrecht.

Lateinisch: Stücke aus Liv. XXII-XXIII; Cic. pro lege Man.; Wiederholung und Erweiterung der Casussyntax nach Zumpt's Grammatik; mündliche Übungen; Exercitien und Extemporalien. 8 St. Hr. Giesebrecht. Virgil. Aen. I; Versübungen. 2 St. Hr. Seyffert. — Griechisch: Hom. Od. IV. V; Xen. Anab. V. VI (erste Hälfte); unregelmäßige Verba; Exercitien und Extemporalien. 6 St. Hr. Nauck. — Hebräisch: Formenlehre bis zu den Gutturalverben nach Gesenius; einzelne Stücke aus Genesis und Psalmen. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Deutsch: Aufsätze und Vorträge; Lectüre aus Schiller und Biographie desselben. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Französisch: Charles douze, IV; Syntax des Pronomen und der Präpositionen; Einiges über den Gebrauch des Infinitiv, der Conjunctionen und über die Rection der Verba, nach Plötz Lehrbuch neueste Ausgabe. C. II, Lection 70-78; Extemporalien und Exercitien. 2 St. Hr. Planer. — Religion: Das Leben Jesu nach den vier Evangelien (Hollenberg's Hülfsbuch); Kirchenlieder. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geschichte: Römische Geschichte von 266 bis Augustus. 2 St. Hr. Giesebrecht. — Geographie: Die Länder von Südwest-Europa. 2 St. Hr. Giesebrecht. — Mathematik: Ähnlichkeit der Dreiecke und Vielecke; Ausmessung der geradlinigen Figuren, nach Jacobs mathem. Schulb. VIII-X § 234 (mit Auswahl). 4 St. Hr. Jacobs.

Obertertia. Ordinarius Oberlehrer Schmidt.

Lateinisch: Curtius IV, V; Ovid. Met. X, 1-77; XI, 1-220 (beide Stücke auch memorirt); XII, 1-535; Metrische Übungen nach Seyffert's Materialien; Lehre vom Gebrauch der Tempora und Modi: mündliches Übersetzen aus Stüple 1; Extemporalien. 10 St. Hr. Schmidt. — Griechisch: Xen. Anab. III, IV; Grammatik; Schreibübungen. 6 St. Hr. Seyffert. — Deutsch: Aufsätze; Übungen im Declamiren und Erzählen, Lectüre aus Bach's Lesebuch II, 2. 2 St. Hr. Schmidt. — Französisch: Grammatik nach Plötz Lehrbuch II, Lection 24-55; Exercitien und Extemporalien; Charles XII. 3 St. Hr. Schmidt. — Religion: Apostelgeschichte; Katechismus; Kirchenlieder und Bibelsprüche. 2 St. Hr. Giesebrecht. — Geschichte: Der Orient und Altgriechenland bis zum Ende der Perserkriege. 2 St. Hr. Giesebrecht. — Geographie: Africa und America, mit Benutzung von Voigt's Leitfaden. 2 St. Hr. Giesebrecht. — Mathematik: Arithmetik, nach Jacobs Math. Schulb. Arithm. I-IV. Zahlen und Zahlensysteme; Begründung der vier Species in ganzen und gebrochenen Zahlen; einfache und zusammengesetzte Zahlen. 3 St. Hr. Jacobs.

Untertertia. Ordinarius von Coet. I: Oberlehrer Täuber, von Coet II: Oberlehrer Dr. Planer.

Lateinisch: Casussyntax nach der Ellendt-Seyffert'schen Grammatik; Einübung derselben nach O. Schulz Aufgaben; wöchentliche Extemporalien; Caes. de bello Gall. V; Cornel. Nep. vita Attici. 8 St. Coet. I Hr. Täuber; Coet. II Hr. Planer. Ovid. Met. II, 1-400; prosod. Regelu. 2 St. Coet. I Hr. Täuber; Coet. II bis Weihnachten Hr. Ribbeck, dann bis Ostern Hr. Schwerdt. — Griechisch: Formeulehre bis zu den Verbis auf μ (incl.); Übersetzung aus der Beispielsammlung zu Buttman's und Rost's Grammatiken; wöchentliches Extemporale. 6 St. Coet. I Hr. Pomtow, Coet. II Hr. Nauck. — Deutsch: Aufsätze; Erklären von Lesestücken aus Bach's Lesebuch II, 1. 2 St. Coet. I Hr. Täuber, Coet. II bis Weihn. Hr. Ribbeck, dann Hr. Schwerdt. — Französisch: Unregelmäßige Verba mit Benutzung von Plötz Lehrbuch, Cursus II, 1-23; schriftliche Arbeiten; Florian, Guill. Tell. 3 St. Coet. I Hr. Täuber, Coet. II Hr. Planer. — Religion: Geschichte des alten Testaments; Katechismus; Kirchenlieder und einzelne Psalmen. 2 St. Beide Coet. combin. Hr. Wehrenpfennig. — Geschichte: Deutsche Geschichte von Rudolf von Habsburg an, mit besonderer Berücksichtigung der brandenburgisch-preussischen Geschichte. 2 St. Coet. I Hr. Täuber, Coet. II Hr. Nauck. — Geographie: Deutschland mit vorzüglicher Berücksichtigung des preuss. Staates. 2 St. Coet. I Hr. Täuber, Coet. II bis Weihn. Hr. Ribbeck, dann Hr. Schwerdt. — Mathematik: Elemente der Planimetrie bis zur Congruenz der Dreiecke und Parallelogramme incl. (Jacobs Math. Schulb. Geom. I-IV). Im Rechnen: Umgekehrte Regeldeutri; Kettenatz; Mischungsrechnung. 3 St. Coet. I Hr. Simon, Coet. II Hr. Planer.

Quarta. Ordinarius Adj. Prof. Dr. Kirchhoff.

Lateinisch: Grammatik (Participialconstructionen, Abl. absol.; Erweiterung der Lehre vom Acc. c. Inf., ut, quod; Praepositionen); Lectüre des Corn. Nepos; Extemporalien. 10 St. Hr. Kirchhoff. — Griechisch: Formenlehre bis zu den Verb. mutis; Übersetzen aus dem Griechischen ins Deutsche und umgekehrt. 6 St. Hr. Mützell. — Deutsch: Aufsätze; Lese- und Declamirübungen aus Bach's Lesebuch III. 2 St. bis Weihnachten Hr. Weber, dann Hr. Dinse. — Französisch: Grammatik nach Plötz Lehrb. I, 50-80; Exercitien und Extemporalien. 2 St. bis Weihn. Hr. Weber, dann Hr. Dinse. — Religion: Geschichte des neuen Testaments nach Zahn; Katechismus; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Kirchhoff. — Geschichte und Geographie: Übersicht der römischen Geschichte bis Augustus; Geographie von Altitalien; Übersicht der Orographie und Hydrographie von Europa. 3 St. Hr. Planer. — Rechnen und Raumlehre: Regeldetri, Prozentrechnung und Anwendung auf Gewinn, Verlust, Rabatt u. s. w.; Gesellschaftsrechnung; anschauliche Entwicklung der geometrischen Grndbegriffe. 3 St. Hr. Simon. — Freies Handzeichnen: 2 St. Hr. Bellermann.

Quinta. Ordinarius Adj. Pomtow.

Lateinisch: Fortsetzung der Formenlehre bis zu den anormalen Verbis; Syntax (der zusammengesetzte Satz; Acc. c. inf.; nt, ut non, ne u. s. w.); Übersetzen aus Blume's Elementarbuch und O. Schulz Aufgaben; wöchentliches Extemporale. 10 St. Hr. Pomtow. — Deutsch: Leseübungen aus Wackernagel's Lesebuch I; Auswendiglernen von Gedichten; Aufsätze; orthographische Übungen. 2 St. Hr. Pomtow. — Französisch: Elemente nach Plötz Lehrb. Curs. I, 1-50; Exercitien und Extemporalien. 3 St. bis Weihn. Hr. Weber, dann Hr. Dinse. — Religion: Geschichte des alten Testaments, nach Zahn § 1-41; Katechismus, Hauptst. I u. II; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geographie: Wiederholung des Pensums von Sexta und Übersicht der natürlichen Geographie, nach Voigt, Curs. II bis § 24. 2 St. Hr. Diltthey. — Rechnen: Die vier Species mit Brüchen. 3 St. Hr. Simon. — Freies Handzeichnen: 2 St. Hr. Bellermann. — Schreiben: 4 St. Hr. Lefshaft.

Sexta. Ordinarius Adj. Dr. Hollenberg.

Lateinisch: Die regelmässigen Formen; mündliches und schriftliches Einüben derselben an Blume's Elementarbuch und O. Schulz Aufgaben; Extemporalien. 10 St. Hr. Hollenberg. — Deutsch: Übungen im Lesen und Erzählen nach Wackernagel's Lesebuch I; Memoriren; orthographische Übungen. 2 St. Hr. Hollenberg. — Religion: mit Quinta combinirt. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geographie: Voigt's Leitfaden Curs. I und von Curs. II die Einleitung nebst den

Paragrapheu über Australien, Africa und Asien, bis § 21 incl. 4 St. Hr. Diltthey. — Rechnen: Die vier Species mit ganzen Zahlen. 4 St. Hr. Simon. — Freies Handzeichnen: mit Quinta combinirt. 2 St. Hr. Bellermann. — Schreiben: mit Quinta combinirt. 4 St. Hr. Lefshaft.

B. Im Sommerhalbjahr.

Oberprima. Ordinarius bis Johannis Schulrath und Prof. Dr. Mützell, dann Schulrath und Director Dr. Kiefsling.

Lateinisch: Tacit. Agricol., Aufsätze, Exercitien, Extemporalien, Übungen im Lateinisch-Sprechen. 6 St. bis Johannis Hr. Mützell, dann Kiefsling. Horat. Carm. I. 2 St. Hr. Seyffert. — Griechisch: Plat. Kriton und Phaedon. 2 St. Hr. Seyffert. Soph. Antigona; Hom. Ilias XV, 592 bis XVII und Repetitionen aus den früheren Büchern mit der ersten Abtheilung; Moduslehre; Extemporalien. 4 St. Hr. Jacobi. — Hebräisch: Wiederholung der Formenlehre; Genesis 20-29; Psalm. 32-37. 2 St. Hr. Hollenberg. — Deutsch: Litteraturgeschichte des 17ten und 18ten Jahrh. bis Lessing (incl.); Aufsätze und Disponirübungen. 3 St. bis Joh. Hr. Mützell, dann Hr. Wehrenpennig. — Französisch: Racine Athalie; Exercitien und Extemporalien. 2 St. Hr. Conrad. — Religion: Glaubenslehre, 3. Artikel (Holl. Hilfsbuch § 176-192); Korintherbriefe; die letzten Capitel der Apokalypse; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Hollenberg. — Geschichte: Griechische Geschichte bis auf Alexander; Wiederholung der mittleren und neueren Geschichte. 3 St. Hr. Kirchhoff. — Mathematik: Analytische Geometrie; Repetitionen; algebraische und geometrische Übungen. 4 St. Hr. Conrad. — Physik: Die wichtigsten Theile der Optik. 2 St. Hr. Simon.

Unterprima. Ordinarius Prof. Dr. Seyffert.

Lateinisch: Cic. orat. pro Sestio; Scripta, Extemporalien; Stil- und Disputirübungen. 6 St. Hr. Seyffert. Horat. Carm. I, 1-28. 2 St. Hr. Passow. — Griechisch: Hom. Il. I-VI; Thucyd. VI; Syntax; Scripta. 6 St. Hr. Passow. — Hebräisch: mit Oberprima combinirt. 2 St. Hr. Hollenberg. — Deutsch: Litteraturgeschichte vom Beginn des 10ten bis Ausgang des 13ten Jahrhunderts; Aufsätze. 3 St. Hr. Kirchhoff. — Französisch: Ségur histoire de Napoléon etc. VII-IX; Übersetzen aus Fränkel's Anthologie, Curs. II. 2 St. Hr. Conrad. — Religion: mit Oberprima combinirt. 2 St. Hr. Hollenberg. — Geschichte: mit Oberprima combinirt. 3 St. Hr. Kirchhoff. — Mathematik: Stereometrie. 4 St. Hr. Conrad. — Physik: mit Oberprima combinirt. 2 St. Hr. Simon.

Obersecunda. Ordinarius Prof. Jacobs.

Lateinisch: Cic. oratt. p. rege Deiotaro und p. Ligario; Liv. III größtentheils; Wiederholung einzelner Theile der Grammatik; mündliches Übersetzen aus Seyffert's Übungsbuch; Exercitien und Extemporalien. 8 St. Hr. Jacobs. Virg. Aen. V, 604 bis VI; Versübungen. 2 St. Hr. Seyffert. — Griechisch: Hom. Od. XIII-XVIII; Herod. VII; Syntax; Scripta. 6 St. Hr. Passow. — Hebräisch: Wie im Winterhalbjahr. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Deutsch: Aufsätze und Vorträge; Erläuterung Schiller'scher Gedichte und der geleseenen Dramen. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Französisch: Mélesville, Michel Perrin; Exercitien aus Fränkel's Anthologie, Cours II; Extemporalien. 2 St. Hr. Conrad. — Religion: Das Evangelium Johannis; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geschichte: Von Kaiser Rudolf von Habsburg an bis zu Ende des 15ten Jahrhunderts. 2 St. Hr. Kirchhoff. — Mathematik: Kreisrechnungen; Ebene Trigonometrie. 4 St. Hr. Conrad. — Physik: Mechanik der tropfbar- und der elastisch-flüssigen Körper. 2 St. Hr. Simon.

Untersecunda. Ordinarius Prof. Schmidt.

Lateinisch: Sallust. Catilina; Cic. or. in Catil. I. II; Syntax der Modi nach Zumpt's Grammatik; mündliches Übersetzen aus Süpfle II; Exercitien, Extemporalien. 8 St. Hr. Schmidt. Virgil. Aen. II; Versübungen. 2 St. bis Johannis Hr. Seyffert, dann Hr. Schmieder. — Griechisch: Hom. Od. I-III; Xenoph. Anab. VI (zweite Hälfte) u. VII; Grammatik, Exercitien, Extemporalien. 6 St. Hr. Nauck. — Hebräisch: Wie im Winterhalbjahr. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Deutsch: Aufsätze; Vorträge; Lectüre aus Schiller; Erklärung der Dichtungsarten. 2 St. Hr. Pomtow. — Französisch: Charles douze, V; Syntax nach Plötz Lehrbuch, Cours. II, lect. 58-68 (Artikel, Nomen, Adverb); Extemporalien, Exercitien. 2 St. Hr. Planer. — Religion: Wie im Winterhalbjahr. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geschichte: Römische Geschichte bis zum Anfange der punischen Kriege. 2 St. Hr. Schmidt. — Geographie: Die Länder von Nord- und Ost-Europa. 2 St. Hr. Pomtow. — Mathematik: Wiederholung des arithmet. Pensums von Overtertia; Proportionen; algebraische Zahlen- und Buchstabenrechnung; Ausziehung der Quadratwurzeln; Vorübungen im Auflösen der Gleichungen (Jacobs Math. Schulb. Arithm. V-VII; IX und X). 4 St. Hr. Jacobs.

Obertertia. Ordinarius Oberlehrer Täuber.

Lateinisch: Curtius VI und VII; Ovid. Met. XII, 580 bis zu Ende und XIII, 1-575 (memorirt etwa 320 Verse); Versübungen nach Seyffert's Palästra § 1-7; Syntax der Tempora und Modi; mündliches Übersetzen aus Süpfle I; wöchentliches Extemporale. 10 St. Hr. Täuber. — Griechisch: Xen. Anab. I. II; Grammatik (unregelmäßige Verba); Schreibübungen. 6 St. Hr. Seyffert. — Deutsch: Auf-

sätze; Übungen im Declamiren und Erzählen; Erklärung gelesener Stücke aus Bach's Lesebuch Th. IV. 2 St. Hr. Diltthey. — Französisch: Charles XII; Grammatik nach Plötz Lehrbuch II, lect. 24-50; Exercitien, Extemporalien. 3 St. Hr. Schmidt. — Religion: Reformationsgeschichte; Wiederholung des Katechismus und der früher erlernten Kirchenlieder. 2 St. Hr. Diltthey. — Geschichte: Griechische Geschichte von Perikles bis Alexander; Wiederholung der früheren Geschichte. 2 St. Hr. Täuber. — Geographie: Asien und einiges von Australien, mit Benutzung von Voigt's Leitfaden, Curs. III und IV. 2 St. Hr. Täuber. — Mathematik: Wiederholung des geometrischen Pensums von Untertertia; Flächengleichheit der Parallelogramme und Dreiecke; gerade Linien und Winkel in Verbindung mit dem Kreis; Kreistheilung; Vielecke im Allgemeinen und regelmäßige insbesondere (Jacobs Math. Schulb. Geom. V-VII). 3 St. Hr. Jacobs.

Untertertia. Ordinarius von Coet. I Oberlehrer Dr. Planer,
von Coet. II Prof. Dr. Kirchhoff.

Lateinisch: Caesar de b. Gall. VI-VII bis cap. 15; Grammatik wie im Winterhalbjahr; Extemporalien 8 St. Coet. I Hr. Planer, Coet. II Hr. Kirchhoff. Ovid, Met. III. 2 St. Coet. I Hr. Schwerdt; Coet. II Hr. Kirchhoff. — Griechisch: Formenlehre bis zu den Verbis auf μ ; wöchentliches Extemporale; Lectüre aus Jacobs Elementarbuch. 6 St. Coet. I Hr. Nauck, Coet. II Hr. Schmieder. — Deutsch: Aufsätze; Übungen im Erzählen und Declamiren, mit Benutzung von Bach's Lesebuch II. 2 St. Coet. I Hr. Schwerdt, Coet. II Hr. Schmieder. — Französisch: Wie im Winterhalbjahr. 3 St. Coet. I Hr. Planer, Coet. II Hr. Täuber. — Religion: Evangelium Matthaei; Wiederholung des Katechismus; Kirchenlieder und einige Psalmen. 2 St. Beide Coetus combinirt. Hr. Wehrenpennig. — Geschichte: Deutsche Geschichte vom Anfange bis auf Kaiser Rudolf von Habsburg. 2 St. Coet. I Hr. Nauck, Coet. II Hr. Pomtow. — Geographie: 2 St. Coet. I Die europäischen Halbinseln. Hr. Schwerdt. Coet. II England, Scandinavien, Niederlande, Rußland, Polen. Hr. Pomtow. — Mathematik: Geometrie und Rechnen wie im Winterhalbjahr. 3 St. Coet. I Hr. Planer, Coet. II Hr. Simon.

Quarta. Ordinarius Gymnasiallehrer Pomtow.

Lateinisch: Wiederholung der früheren Pensa; Participialconstructionen, Abl. absol.; Erweiterung der Lehre vom Acc. c. inf., ut, quod u. s. w.; Lectüre des Corn. Nepos; Extemporalien. 10 St. Hr. Pomtow. — Griechisch: Formenlehre bis zu den Verbis mutis; Übersetzen aus Jacobs Elementarbuch. 6 St. bis Johannis Hr. Mützell, dann Hr. Pomtow. — Deutsch: Aufsätze, Lese- und Declamirübungen (Bach's Lesebuch III); Übungen im Gebrauch der Präpositionen. 2 St. Hr. Schmieder. — Französisch: Grammatik nach Plötz Lehrbuch I, 50 bis 85;

Extemporalien. 2 St. Hr. Schmieder. — Religion: Geschichte des Neuen Testaments nach Zahn; Katechismus, Hauptst. 3-5; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Schmieder. — Geschichte und Geographie: Übersicht der griechischen Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeronea; Geographie von Alt-Griechenland; Übersicht der Orographie und Hydrographie von Asien und America. 3 St. Hr. Plauer. — Rechnen und Raumlehre: Wie im Winterhalbjahr. 3 St. Hr. Simon. — Freies Handzeichnen: 2 St. Hr. Bellermann.

Quinta. Ordinarius Adjunct Dr. Hollenberg.

Lateinisch: Fortsetzung der Formenlehre bis zu den anomalen Verbis; Gebrauch des Acc. cum inf.; ut, ne, cum u. s. w.; Extemporalien und Exercitien; Übersetzen aus Blume's Lesebuch, Curs. II. 10 St. Hr. Hollenberg. — Deutsch: Übungen im Lesen und Erzählen, nach Wackernagel's Lesebuch I; Memoriren; orthographische Übungen. 2 St. Hr. Hollenberg. — Französisch: Gram. nach Plötz Lebrb. I, 1-50; Exercitien und Extemporalien. 3 St. Hr. Dinse. — Religion: Geschichte des alten Testaments, nach Zahn; Katechismus, Hauptst. I und II; Kirchenlieder. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geographie: America und Europa, nach Voigt's Leitfaden. Curs. II. 2 St. Hr. Dinse. — Rechnen: Wie im Winterhalbjahr. 3 St. Hr. Simon. — Freies Handzeichnen: 2 St. Hr. Bellermann. — Schreiben: 4 St. Hr. Lefshaft. —

Sexta: Ordinarius Adjunct Dilthey.

Lateinisch: Die regelmäßigen Formen; schriftliche und mündliche Übungen nach Blume's Elementarbuch und O. Schulz Aufgaben; wöchentliches Extemporale 10 St. Hr. Dilthey. — Deutsch: Übungen im Lesen und Erzählen; schriftliche Übertragungen von Gedichten in Prosa; Memoriren aus Wackernagel's Lesebuch I; orthographische Übungen. 2 St. Hr. Dilthey. — Religion: Mit Quinta combinirt. 2 St. Hr. Wehrenpfennig. — Geographie: Voigt's Leitfaden Curs. I u. II. 4 St. Hr. Dinse. — Rechnen: Wie im Winterhalbjahr. 4 St. Hr. Simon. — Freies Handzeichnen: Mit Quinta combinirt. 2 St. Hr. Bellermann. — Schreiben: Mit Quinta combinirt. 4 St. Hr. Lefshaft.

Außerdem ist noch folgender Unterricht ertheilt worden:

1. Während des Winterhalbjahrs allein:
Juristische Propädeutik: für die künftigen Juristen unter den Primanern.
2 St. Hr. Geh. Justizrath Prof. Dr. Rudorff.
2. Während des ganzen Schuljahrs:
Englisch: Schüler aus Prima und Secunda in 2 Abtheilungen. 4 St. Hr. Oberl. Dr. Philipp.
Italienisch: Schüler aus Prima. 2 St. Hr. Prof. Fabbrucci.

Singen: Alumnen: in 2 Classen (3 Abtheil.). 4 St. Hr. Musikdir. Dr. Hahn.

Hospiten: in 3 Classen (4 Abtheil.).

1te Classe, Schüler aus allen Gymnasialclassen. 2 St. Hr. Musikdir. Dr. Hahn.

2te Classe, Schüler aus den Gymnasialclassen von Secunda bis Sexta (2 Abtheil.). 4 St. Hr. Cantor Wendel.

3te Classe, Schüler aus den Gymnasialclassen von Quarta bis Sexta. 2 St. Hr. Cantor Wendel.

Freies Handzeichnen: Schüler aus den Classen von Prima bis Untertertia. 2 St. Hr. Prof. Bellermann.

Planzeichnen: Schüler aus denselben Classen. 2 St. Hr. Brügner.

Schreiben: Schüler aus den Classen von Prima bis Quarta. 2 St. Hr. Lefshaff.

Turnen: Alumnen in 2 Abtheil. 4 St. Hr. Prof. Schmidt.

Hospiten in 2 Abtheil. 4 St. Hr. Prof. Schmidt.

II. L e h r e r.

In dem Lehrpersonal der Anstalt haben im Laufe dieses Schuljahres sehr viele und bedeutende Änderungen stattgefunden.

Zuerst ist hier das Ausscheiden des ältesten Lehrers, Herrn Prof. Dr. Karl Köpke, aus dem Amte zu erwähnen. Er hatte am 1. December 1806 als Mitglied des Seminars für gelehrte Schulen am Köllnischen Gymnasium seine öffentliche Wirksamkeit begonnen, am hiesigen Friedrichs-Werderschen Gymnasium und seit 1810 am Friedrichs-Collegium zu Königsherg i. Pr. dieselbe fortgesetzt, endlich seit Ostern 1817 volle 40 Jahre lang dem Joachimsthalschen Gymnasium angehört. Bei der Feier seines funfzigjährigen Aintsjubiläums, welche am 1. December v. J., zwar ohne allen Prunk, aber mit desto herzlicheren Liebesbeweisen aller Betheiligten stattfand, und wobei ihm durch die Gnade Sr. Majestät des Königs der Rothe Adler-Orden IV. Klasse verliehen wurde, waren nächst der vorgesetzten Provinzial-Schulbehörde die sämmtlichen vorher genannten Schulen theils durch Deputationen, theils durch Schreiben vertreten. Unser Gymnasium namentlich bethätigte seine Theilnahme durch eine von Hrn. Prof. Seyffert gedichtete lateinische Ode, welche dem Jubilar nebst einem Ehrengeschenk von sämmtlichen Lehrern überreicht wurde. Auf gleiche Weise, so wie durch einen am frühen Morgen dargebrachten Gesang hatten die Schüler der Anstalt ihre Dankbarkeit kundgegeben. Nach dieser Feier war Hr. Prof. Köpke noch ein Vierteljahr lang im Schulamt wirksam, bis er zu Ostern d. J. seine mehr als funfzigjährige erfolgreiche Thätigkeit beschloß, um von da an der wohlverdienten Ruhe zu genießen.

Zu derselben Zeit schied Herr Prof. Dr. Wilhelm Giesebrecht aus seinem bisherigen Amte, nachdem er fast 20 Jahre, seit Johannis 1837, zuerst als Adjunct

und ordentlicher Lehrer, dann als Oberlehrer und seit 1851 als Professor unserer Anstalt angehört hatte. Er vertauschte dieses Schulamt, in dem er auf erfolgreiche Weise anregend und belebend gewirkt hat, mit der ihm übertragenen Stelle eines ordentlichen Professors der Geschichte an der Universität zu Königsberg i. Pr.

Die eben genannten Veränderungen hatten zur Folge, daß zu Ostern d. J. an Hrn. Prof. Köpke's Stelle Hr. Prof. Jacobs zum Bibliothekar des Gymnasiums ernannt wurde, und die beiden Adjuncten und ordentlichen Lehrer, Hr. Prof. Dr. Kirchhoff und Hr. Pomtow aus diesen Stellen ebenfalls zu Ostern d. J. in die Zahl der oberen Lehrer aufrückten. In die dadurch erledigten Adjuncturen traten sofort die Herrn Candidaten Wilhelm Dilthey und Dr. Paul Schmieder ein.

Noch weiter greifend waren die Veränderungen, welche mit dem Schlusse des zweiten Vierteljahrs, am 1. Juli d. J., eintraten. Das Haupt der Anstalt selbst, Hr. Director Dr. August Meineke, legte an diesem Tage sein seit dem 1. Juli 1826 geführtes Directorat nieder, und trat in den von ihm gewünschten ehrenvollen Ruhestand zurück. Schon vor dem Antritt dieses Amtes war er Director des Gymnasiums zu Danzig gewesen und hat somit länger, als es den meisten andern vergönnt ist, an der Spitze bedeutender gelehrter Anstalten gestanden.

Es ist hier nicht der Ort die allgemein anerkannten Verdienste des hochgeachteten Mannes um die philologische Wissenschaft rühmend hervorzuheben; aber wohl gebührt es sich für die Schule, welche Hr. Director Meineke volle 31 Jahre lang in einem die sittliche wie die wissenschaftliche Bedeutung einer solchen Erziehungsanstalt würdigenden und umsichtig fördernden Geiste geleitet hat, den Dank dafür wiederholt auch an dieser Stelle auszusprechen. Nicht allein durch das den großen Hörsaal schmückende Bildniß Meineke's, welches die Pietät älterer Zöglinge und Schüler dem Gymnasium verehrt hat, sondern viel mehr noch durch das, was er selbst der Anstalt gewesen ist, wird sein Andenken in dieser fortbestehen, und jeder ihr Angehörige wird sich bewußt sein und bleiben, daß die mancherlei Denkmale der Verehrung und Liebe, die dem Scheidenden von Amtsgenossen wie von älteren und jüngeren Schülern dargebracht worden sind, wahrhafte und aufrichtige Herzen bekundet haben. Als das bedeutendste Zeichen der Anerkennung ist zu erwähnen, daß Se. Majestät der König die Gnade gehabt hat, dem Director Meineke bei dieser Gelegenheit den Charakter eines Geheimen Regierungsrathes beizulegen.

Noch ein vierter Verlust entstand für die Anstalt dadurch, daß ebenfalls zu Johannis d. J. Hr. Prof. Dr. Julius Mützell in Folge seiner Ernennung zum K. Provinzial-Schulrath sein bei unserer Anstalt geführtes Amt niederlegte. Auch er konnte auf eine lange Amtsthätigkeit an dieser Schule zurücksehen, indem er Michaelis 1833 als Adjunct und ordentlicher Lehrer eingetreten und darauf Michaelis 1836 zum Professor befördert worden war. Während dieser Zeit von beinahe 24 Jahren haben das Lehrercollegium und die Schüler dieser Anstalt der einsichtsvollen und vielseitig thätigen und hingebenden Wirksamkeit des Hru. Prov.-Schulraths Mützell

mehr zu verdanken als hier zu schildern der Ort ist, und es genüge daher die Versicherung, daß das aufrichtig dankbare Andenken an ihn eben so, wie das an die übrigen aus der Mitte der Lehrer geschiedenen theuren Amtsgenossen, ein unvergänglich dauerndes sein werde.

Das durch das Ausscheiden des Herrn Directors Dr. Meineke erledigte Directorat der Anstalt ist durch Allerhöchste Kabinettsordre vom 4. März d. J. dem Unterzeichneten allergnädigst übertragen und dabei durch Kabinettsordre von demselben Tage demselben zugleich die Eigenschaft eines Ehrenmitgliedes des Königlichen Schulcollegiums für die Provinz Brandenburg, in welcher hohen Behörde derselbe seit dem Jahre 1850 die Stellung eines Departementsrathes für das höhere Schulwesen der Provinz bekleidet hatte, in huldvollster Weise verliehen worden. Am 1. Juli d. J. erfolgte in Gegenwart sämmtlicher Lehrer, Beamten und Schüler der Anstalt die feierliche Einweisung desselben in sein neues Amt durch des Herrn Oberpräsidenten und Staatsministers Flottwell Excellenz, mit welcher Feier zugleich die Entlassung des durch die Gnade Sr. Majestät des Königs zum Geheimen Regierungsrath ernannten Herrn Director Meineke, sowie die des bisherigen Professors, nummehrigen Provinzialschulraths Hrn. Dr. Mützell verbunden wurde. In herzlichem, aus tiefstem Gemüthe hervordringenden Worten bekundete der hochverehrte Chef der Provinzialschulbehörde seinen innigen Antheil an unserer Anstalt und an den Personen insbesondere, deren amtliche Verhältnisse an diesem Tage eine so bedeutungsvolle Veränderung erlitten. Der Unterzeichnete brachte in seiner Antrittsrede zuvörderst den hohen und höchsten Behörden, die ihn in dieses Amt berufen hatten, seinen ehrerbietigsten Dank dar und nachdem er der Pflicht der dankbarsten Anerkennung der Verdienste seines unmittelbaren Vorgängers ein Genüge gethan hatte, sprach er es als seine Aufgabe aus, die Leitung der Anstalt in gewissenhaftester Beachtung ihres eigenthümlichen Charakters fortan führen zu wollen. Möge diese erbebende Feier, welche die Mitglieder des Königlichen Schulcollegiums und die Directoren der hiesigen Gymnasien mit ihrer Gegenwart beehrten, einer andauernden, segensreichen Nachwirkung nicht verfehlen!

In Folge des eingetretenen Directoratswechsels wurde das Amt eines Alumnatsinspectors, welches zuletzt der Herr Professor Jacobs fünf Jahre mit treuer Sorgfalt verwaltet hatte, aufgehoben, und die damit verbundenen Geschäfte wiederum mit dem Directorate vereinigt, mit welchem sie bis zum Jahre 1846 verbunden gewesen waren.

Noch ist zu erwähnen, daß Herr Oberlehrer Schmidt und der Zeichenlehrer, Herr Belleremann, zu Professoren ernannt worden sind.

Im Laufe des Jahres sind von der Anstalt ausgeschieden die Schulanstaltscandidaten Hr. Dr. Krause, welcher eine Anstellung an der Friedrich-Wilhelms-Schule zu Stettin erhalten hat, Hr. Dr. Weber, welcher als Lehrer an die Lateinische

Hauptschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle und Hr. Dr. Woldemar Ribbeck, welcher als Lehrer an das hiesige Friedrichsgymnasium versetzt worden ist.

Als Mitglieder des Königlichen Seminars für gelehrte Schulen sind gegenwärtig an der Anstalt beschäftigt Herr Dr. Schwerdt und Herr Dr. Dinse. Als außerordentlicher Hülfslehrer hat auch in diesem Jahre Herr Dr. H. Jacobi wiederholt willkommene Aushölfe geleistet.

III. Schüler.

Die Anzahl der Schüler betrug

zu Anfang des Halbjahrs	Ober- prima	Unter- prima	Ober- secunda	Unter- secunda	Ober- tertia	Unter- tertia	Quarta	Quinta	Sexta	Über- haupt
v. Mich. 1856 bis Ost. 1857	16	26	32	49	57	61	51	32	18	342
von Ostern bis Mich. 1857	22	25	36	43	58	60	45	29	18	336

Am Tage der Abfassung dieses Berichts betrug die Gesamtzahl der Schüler: 330.

Darunter waren

{	120 Alumnus.
	12 Pensionäre der Anstalt.
	198 Hospiten.

Am Schlusse des Schuljahres 1855-1856 waren überhaupt Schüler: 356.

Während des Schuljahres 1856-1857 sind bis zu dem oben genannten Tage
neu aufgenommen 93
abgegangen . . . 119

Mit dem Zeugnisse der Reife zu den Universitätsstudien sind entlassen worden:

a) Zu Michaelis 1856: 1) Ernst Heinrich Gustav Laas, aus Fürstenwalde, evangelischer Confession, 19½ Jahr alt, 1½ Jahr Hospes, 4 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Berlin. — 2) Israel Born, aus Jastrow, jüdischen Glaubens, 23 Jahr alt, 6 Jahr Hospes, 2½ Jahr in Prima, studirt Medicin in Berlin. — 3) Hermann Friedrich Wilhelm Krickau, aus Garz, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 1½ Jahr Hospes, 1½ Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Erlangen. — 4) Friedrich Wilhelm Julius Böttcher, aus Potsdam, evangelischer Confession, 17½ Jahr alt, 6½ Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Berlin. — 5) Maximilian Johann Sigismund Stappenbeck, aus Potsdam, evangelischer Confession, 18½ Jahr alt, 4 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Jura und Cameralia in Berlin. — 6) Gustav Hermann Knauth, aus Lübben, evangelischer Confession, 19½ Jahr alt, 5½ Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Halle. — 7) Karl Wilhelm Ernst Wagner, aus Lübben, evangelischer Confession, 20 Jahr alt, ½ Jahr Hospes und 5½ Jahr

Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Philologie in Berlin. — 8) Karl Ludwig Emil Pelzer, aus Berlin, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 9 Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Jura und Cameralia in Berlin. — 9) Friedrich Gustav Alfred Tysska, aus Schwedt a. O., evangelischer Confession, 19 Jahr alt, 2 Jahr Hospes und 5 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Erlangen. — 10) Johann Friedrich Gustav Stehmann, aus Potsdam, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 5 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Medicin in Berlin. — 11) Karl Johannes Gottfried Theodor Fleischer, aus Rathenow, evangelischer Confession, 19½ Jahr alt, 1 Jahr Hospes und 6 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Jura und Cameralia in Berlin. — 12) Karl Friedrich Wilhelm Ludwig Böttcher, aus Potsdam, evangelischer Confession, 19 Jahr alt, 6½ Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Philologie in Berlin. — 13) Ludolf August von Bismarck, aus Magdeburg, evangelischer Confession, 22 Jahr alt, 4½ Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Jura und Cameralia in Greifswald. — 14) Johannes Karl Eduard Hiltmann, aus Berlin, evangelischer Confession, 21 Jahr alt, 9 Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Berlin.

b) Zu Ostern 1857: 1) Gustav Adolf Oskar Fahrenholtz, aus Saudau a. E., evangelischer Confession, 19½ Jahr alt, 5 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie in Berlin. — 2) Karl Ludwig Friedrich Theodor Möhring, aus Merz bei Beeskow, evangelischer Confession, 21½ Jahr alt, 5 Jahr Alumnus, 2½ Jahr in Prima, studirt Theologie in Berlin. — 3) Gotthilf Samuel Paul Marquard, aus Driesen, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 6 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie und Philologie in Berlin. — 4) Heinrich Gustav Maximilian Reyher, aus Trampe bei Neustadt-Eberswalde, evangelischer Confession, 20 Jahr alt, 3½ Jahr Hospes und 5½ Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie in Berlin. — 5) Heinrich Reinhold Otto von Pommer-Esche, aus Berlin, evangelischer Confession, 18½ Jahr alt, 5 Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Jura in Berlin. — 6) Albert Ferdinand August Dittmar, aus Lübben, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 5 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Medicin in Breslau. — 7) Johann Georg Eduard Schneider, aus Neustadt-Eberswalde, evangelischer Confession, 20½ Jahr alt, 2 Jahr Hospes und 5 Jahr Alumnus, 2 Jahr in Prima, studirt Theologie in Berlin. — 8) Karl Wilhelm Julius Asehnborn, aus Müllrose, evangelischer Confession, 20 Jahr alt, 8 Jahr Hospes, 2 Jahr in Prima, studirt Jura und Cameralia in Berlin.

IV. Anderweitiges.

Am 15. October 1856 wurde der Geburtstag Sr. Majestät des Königs in herkömmlicher Weise durch Gesang, Rede und festliche Speisung der Alumnus begangen. Die Festrede hielt der Herr Adjunct Dr. Simon, und handelte darin von der Entwicklung der exacten Wissenschaften in Preussen unter den Hohenzollernschen Fürsten.

Am 1. November 1856 beging die Anstalt die alljährliche Gedächtnisfeier zur Erinnerung an die Einführung der Reformation in die Mark Brandenburg. Dieselbe begann mit Gesang, worauf der Primaner Fahrenholtz eine lateinische Rede über Johann Hufa, und der Primaner Marquard eine deutsche auf die Reformation bezügliche Rede hielt. Nachdem darauf der Director die von dem Magistrat zu Berlin zu diesem Zweck übersandten drei Exemplare der Denkmünze auf die Einführung der Reformation den von dem Lehrercollegium ausgewählten drei Schülern überreicht hatte, wurde die Feier wiederum mit Gesang geschlossen.

Am 1. December 1856 feierte die Anstalt das 50jährige Amtsjubiläum des Herrn Prof. Köpke in der schon oben, in Abschn. II, erwähnten Weise.

Am 6. Junius 1857, dem letzten Tage der unmittelbaren Amtsführung des Herrn Director Dr. Meineke, nahm derselbe in einer herzlichen und ergreifenden Rede von den zum letztenmal um ihn versammelten Lehrern und Schülern der Anstalt Abschied. Nachdem noch an demselben Tage die letztern, und zwar das Lehrercollegium unter dem Vortritt des Herrn Schulrath Dr. Mätzell, die Schüler durch eine Deputation aus ihrer Mitte, dem geliebten bisherigen Leiter und Lehrer die Worte und Zeichen ihrer aufrichtigen Dankbarkeit dargebracht hatten, erschienen am folgenden Vormittage die Vertreter der früheren Schüler und Zöglinge des Gefeierten, von dem Danziger und dem Joachimsthal'schen Gymnasium, um ein Gleiches zu thun. Die zuletzt genannten hatten außer andern den schönen Gedanken ins Werk gesetzt, das in Öl gemalte wohlgetroffene Bildniß des Director Meineke unserer Anstalt zur bleibenden Erinnerung zu überreichen. Das Lehrercollegium kann nicht unterlassen den Dank für dieses höchst werthvolle Geschenk an die geehrten Geber auch an dieser Stelle wiederholt auszusprechen.

Am 14. Junius 1857 begingen die Lehrer und Zöglinge der Anstalt die gemeinsame Feier des heiligen Abendmahls.

Eine außergewöhnliche Festlichkeit fand am 24. August 1857 statt. Am Bartholomäustage des Jahres 1607 ist unser von dem frommen Churfürsten Joachim Friedrich gestiftetes Gymnasium als Fürstenschule in dem Städtchen Joachimsthal feierlich inaugurirt worden, und es hatte somit an dem obengenannten Tage seinen 250. Geburtstag erreicht. Da die Feier als nicht volle Säcularfeier keinen officiellen Charakter haben konnte, so beschränkte sich dieselbe auf den Kreis der gegenwärtig der Anstalt unmittelbar Angehörigen. Am Morgen um 7 Uhr begann mit einem vom Chor vorgetragenen Psalm der Scholactus, wobei der unterzeichnete Director die Festrede hielt und darin nach einem Rückblick auf die Verhältnisse, unter denen die früheren Jubelfeste begangen worden sind, hauptsächlich bei der Schilderung der Verdienste und der umfassenden Wirksamkeit des vormaligen Rector Meierotto verweilte. Der gemeinschaftliche Gesang des Liedes „Nun danket alle Gott“ beschloß diesen ersten Theil des Festen. Fortgesetzt wurde dasselbe in heiterer Weise dadurch, daß sich die Lehrer und Ober-Beamten der Anstalt mit ihren Familien,

die sämmtlichen Zöglinge, so wie die Unter-Bedienten nach dem zwischen Erkner und Woltersdorf gelegenen Forsthause begaben, welches der Magistrat von Berlin mit höchst dankenswerther und freundlicher Bereitwilligkeit uns für diesen Tag zur Verfügung gestellt hatte. Dort wurde ein einfaches Mahl im Freien gehalten, und dabei zunächst in freudiger Anhänglichkeit Sr. Majestät dem König ein Lebehoch dargebracht. Diesem folgten noch Trinksprüche auf die Gesamtheit unserer Anstalt, auf die ehemaligen Lehrer, auf die ehemaligen Schüler derselben, und noch manche andere. Die Gesänge eines Chors von etwa 20 Alumnen belebten das Mahl. Die übrige Zeit bis zur Rückkehr wurde durch gemeinschaftliche Spiele im Freien ausgefüllt, und so nahm das ganze Fest einen solchen Verlauf, daß wir mit allem Grund annehmen können, es werde jeder der Theilgenossen sich dieses Tages in dauernder Freude erinnern und dabei auch des vielfachen Guten und Gedeihlichen sich bewußt bleiben, das eine solche aus frommer und aufopfernder Liebe gestiftete Anstalt in ihrem Schooße trägt und zur Reife bringen kann, wenn keiner, der zu ihrer Pflege entweder irgendwie berufen oder derselben anvertraut ist, es an sich fehlen läßt. Den hohen Behörden, welche durch ihre Genehmigung diese Feier möglich machten, spreche ich im Namen der Anstalt hierdurch meinen wärmsten Dank aus.

Im Laufe dieses Sommers ist das Gymnasium zweimal durch den Besuch Sr. K. H. des Prinzen Georg von Preußen beehrt worden, welcher die von der Hochsel. Prinzessin Amalie von Preußen der Anstalt geschenkte Bibliothek, und namentlich den musikalischen Theil derselben, in Augenschein nahm.

Noch ist zu erwähnen, daß der Rechant der Schul-Hauptkasse und Ökonomie-Inspector der Anstalt, Herr Pollack, von Sr. Majestät dem König zum Rechnungsrath ernannt worden ist.

V. Verordnungen

des Königl. Provinzial-Schuleollegii.

1) Vom 24. October 1856. Das von dem Director Bonnell bearbeitete Vocabularium wird empfohlen.

2) Vom 11. Mai 1857. Es wird bestimmt, daß die Oster-, Michaelis- und Weihnachtsferien vierzehn Tage, die Pfingstferien vier Tage, die Sommerferien vier Wochen vom Donnerstag nach dem 1. Juli ab, dauern sollen.

3) Vom 16. Mai 1857. Bestimmung, daß kein Lehrbuch ohne besondere Genehmigung eingeführt, und ein Verzeichniß der eingeführten Bücher und sonstigen Lehrmittel in das Programm aufgenommen werden soll.

4) Vom 16. Mai 1857. Bestimmung, daß sich der geschichtliche und geographische Unterricht in allen Klassen der Gymnasien und Realschulen an ein gedrucktes Lehrbuch anschließen soll, und daß die Zahl der für jede dieser beiden Disciplinen bestimmten Leitfäden an einer und derselben Anstalt auf zwei zu beschränkt ist.

5) Vom 26. Juli 1857. Studierende der Theologie sollen nicht eher in den Genuß eines akademischen Beneficiums gelangen, als bis sie auch die Reife im Hebräischen nachgewiesen haben.

6) Mittheilung des Magistrats von Berlin vom 14. Juli 1857, betreffend die Begründung zweier Stipendien für Studierende der Medicin durch ein Vermächtniß der Wittve des Hofwundarztes Rudolph. Der jährliche Betrag eines jeden Stipendiums ist 96 Thlr. 9 Sgr.

VI. Lehrapparat.

Die Bibliotheken des Gymnasiums sind theils aus dem dazu bestimmten etatsmäßigen Fonds, theils durch die nachstehend genannten Geschenke vermehrt worden:

1) *Tragicorum graecorum fragmenta* rec. Augustus Nauck. Lipsiae 1856. 8. Vom Herausgeber. — 2) R. Jacobs, *Mathematisches Schulbuch* für die mittlern Gymnasialklassen. Berlin 1856. 8. Vom Verfasser. — 3) E. Fidicin, Kaiser Karls IV. *Landbuch der Mark Brandenburg*, nach den handschriftlichen Quellen. Berlin 1856. 4. Vom Königl. Ministerium. — 4) *Astronomische Beobachtungen auf der Königl. Universitätssteruwarte zu Königsberg*. Abtheilung 28-30. Königsberg 1856 und 1857. Vom Königl. Ministerium. — 5) Sophokles erklärt von F. W. Schneidewin. Bd. 2. *Oedipus Tyrannos*. 3. Aufl. von A. Nauck. Berlin 1856. 8. Vom Herausgeber. — 6) Rud. Anast. Köpke, *Ein Familiendenkmal*, zur Feier des ersten Decembris 1856. 4. Vom Verfasser. — 7) Verzeichniß der von Bradley, Piazz, Lalande und Bessel beobachteten Sterne, berechnet von Argelander. Berlin 1856. fol. Vom Geh. Reg. Rath Dr. Meineke. — 8) Io. Dallaei, *de usu patrum ad ea definienda religionis capita, quae hodie sunt controversa*, libri duo. Genevae 1656. 4. Von Dr. Hollenberg. — 9) Raynerii Sneygoudani *Psalterium Davidicum*. Von demselben. — 10) H. I. Floss, *de Macariorum Aegyptii et Alexandrini vitis quaestiones criticae et historicae*. Novesii 1847. 8. Von demselben. — 11) D. F. Zastrau, *De Iustini martyris biblicis studiis*. Commentatio historico-critica. Vratislaviae 1831. 8. Von demselben. — 12) I. Görres, *Athanasius*. 2. Aufl. Regensburg 1836. 8. Von demselben. — 13) C. Plinius Secundus *Naturgeschichte*. Übersetzt und mit erläuternden Registern versehen von Chr. F. L. Strack. Bremen 1853. 8. 3 Bde. Vom Königl. Ministerium. — 14) Euripidis *tragoediae* ex rec. Aug. Nauckii. Ed. altera. Lipsiae, 1857. 8. 2 Voll. Vom Herausgeber. — 15) I. Kaiser *Griechisches Vocabularium*. Vom Königl. Ministerium. — 16) W. Giesebrecht, *Geschichte der deutschen Kaiserzeit*. Bd. 2, Lief. 1. Braunschweig 1857. 8. Vom Verfasser. — 17) A. F. Riedel, *Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis*. Des 1. Haupttheils Bd. XII und XIII. Berlin 1857. 4. Vom Königl. Ministerium. — 18) Moritz Seyffert, *Scholae latinae*. Beiträge zu einer methodischen Praxis der

lateinischen Stil- und Compositionsübungen. 2. Theil: die Chrie. Leipzig 1857. 8. Vom Verfasser — 19) Maur. Seyffert, Carmina latina. De poetis alienigenis, maxime germanicis convertit. Lips. 1857. 8. min. Vom Verfasser. — 20) E. Fidicin, die Territorien der Mark Brandenburg u. s. w. als Fortsetzung des Landbuchs Kaiser Karls IV. Band. 1. Berlin 1857. 4. Vom Königl. Ministerium. — 21) Luc. Müller, Über den Auszug aus der Ilias des sogenannten Pindarus Thebanus (Homerus latinus). Berlin 1857. 8. Vom Verfasser. — 22) Fr. Fiedler, Verskunst der lateinischen Sprache mit Aufgaben zur Versification; zum Gebrauch in den mittleren und oberen Classen der Gymnasien. 3. Aufl. Wesel, bei W. Hülsemann. 1858. 8. Vom Verleger. — 23) Schriften der Universität zu Kiel aus dem Jahre 1856. Band III. Kiel 1857. 4. Von der Commission zur Herausgabe der Kieler Universitätschriften. — 24) Handbüchlein der Missionsgeschichte und Missionsgeographie. Herausgegeben vom Calwer Verlags-Verein. Calw u. Stuttgart. 1846. 8. Von Dr. Hollenberg (für die Schülerbibliothek). — 25) H. I. Gräber, Reformationsbüchlein oder Geschichte der Reformation für das deutsche Volk. Duisburg s. a. 8. Von demselben (für die Schülerbibliothek). — 26) A. F. W. Sack, Drei Dankpredigten über die von dem großen Könige Friedrich II. im Jahre 1757 erfochtenen Siege bei Prag, bei Rosbach und bei Leuthen, in demselben Jahre im Dom zu Berlin gehalten. Zum hundertjährigen Gedächtnis der genannten Schlachten wieder herausgegeben. Berlin 1857. 8. Vom Königl. Ministerium. — 27) I. Bartsch, Das historische Tagebuch für die deutsche Jugend. Bd. I. Lief. 1. Berlin 1857. 8. Vom Verfasser.

Für alle diese Geschenke verfehle ich nicht den Gebern im Namen der Anstalt auf das verbindlichste zu danken.

Das physikalische Kabinet ist durch die Anschaffung eines großen Inductions-Apparats nach Ruhmkorff mit Neef'schem Unterbrecher, Stromwender und elektrischem Ei nebst Condensator zur Darstellung der Lichterscheinungen im luftleeren Raum, und durch eine große Laterna magica bereichert worden.

Verzeichniß der eingeführten Lehrbücher.

Unterrichtsgegenstand	Classen	Lehrbuch
Lateinisch	VI-III	Ellendt-Seyffert, Grammatik.
	II-I	Zumpt, Grammatik.
	VI-V	Blume, Elementarbuch.
	VI-III, b	O. Schulz, Aufgaben.
	III, a-II, b	Stüpfle, Aufgaben zu Stylübungen.
	III, a-II, a	Seyffert, Lesestücke.
	II, a	Seyffert, Übungsbuch für Secunda

Unterrichtsgegenstand	Classen	Lehrbuch
Griechisch	IV-II, b II, b-1 IV-III, b	C. Franke, Formenlehre. Buttmann, Grammatik. Fr. Jacobs, Elementarbuch.
Hebräisch	II, b-1	Gesenius, Grammatik.
Deutsch	VI-V IV-III, a	Ph. Waackernagel, Lesebuch. N. Baeh, Lesebuch.
Französisch	V-II, b II, a-1	Plötz, Lehrbuch. Fränkel, Anthologie.
Religion	VI-1 VI-IV VI-1	Bibel, Katechismus, Gesangbuch. Zahn, Biblische Historien. Hollenberg, Hilfsbuch.
Geographie	VI-III, a VI-II, b III, a-1	Voigt, Leitfaden. v. Sydow, Atlas. Kiepert, Atlas der alten Welt.
Mathematik	III, b-II, b II, a-1	R. Jacobs, Schulbuch. Rühlmann, Logarithmentafeln.
Rechnen	VI-III, b	Fölsing, Rechenbuch.

VII. Unterstützungen.

An Unterstützungen sind im Laufe des Schuljahres 400 Thaler an Sehtler und gegen 1500 Thaler an Stipendien für Studirende gezahlt worden.

VIII. Die öffentliche Prüfung

wird Dienstag am 29. September in nachstehender Ordnung gehalten werden:

Vormittags von 8½ Uhr an: Gesang. Obertertia: Religion Adjunct Dilthey; Latein Oberlehrer Täuber. Untersecunda: Griechisch Adjunct Dr. Nauek; Geschichte Professor Schmidt. Oberseeunda: Latein Professor Jacobs; Physik Adjunct Dr. Simon. Unterprima: Deutsch Professor Dr. Kirehhooff. Deutsche Rede des Abiturienten Schüde. Oberprima: Horaz Professor Dr. Seyffert. Lateinische Rede des Abiturienten Linn. Entlassung der Abiturienten. Gesang.

Nachmittags von 2 $\frac{1}{2}$ Uhr an: Gesang. Sexta: Geographic Dr. Dinse.
Quinta: Latein Adjunct Dr. Hollenberg. Quarta: Griechisch Gymnasiallehrer
Pontow. Untertertia, beide Coetus: Religion Adjunct Dr. Wehrenpfennig.
Coetus I: Griechisch Adjunct Dr. Schmieder. Coetus II: Mathematik Oberlehrer
Dr. Planer. Gesang.

Die Vertheilung der Prämien erfolgt nach der Prüfung der einzelnen Klassen.

Der Winterkursus beginnt mit dem 14. October. Zur Aufnahme neuer
Schüler ist der Director vom 5. October ab, mit Ausnahme der Sonntage, jeden
Vormittag von 10 Uhr an bereit.

Dr. Kiefling.



Vertheilung der Lehrstunden unter die Lehrer.

Lehrer	Classen-ordinarien	Ober- prima	Unter- prima	Ober- secunda	Unter- secunda	Ober- tertia	Unter- tertia Coet. I.	Unter- tertia Coet. II.	Quarta	Quinta	Sexta	Sum- ma
Director Dr. Kiefaling	Ober- prima	6 Latein.										6
Professor Dr. Conrad		4 Mathem. 2 Französ.	4 Mathem. 2 Französ.	4 Mathem. 2 Französ.								18
Professor Da. Passow			2 Latein. 6 Griech.	6 Griech.								14
Professor Jacobs	Ober- secunda			8 Latein.	4 Mathem.	3 Mathem.						15
Professor Dr. Seyffert	Unter- prima	2 Latein. 2 Griech.	6 Latein.	2 Latein.		6 Griech.						18
Professor Schmidt.	Unter- secunda				8 Latein. 2 Gesch.	3 Französ.						21
8 Turnen in vier Abtheilungen (jede Abtheilung 2 St.)												
Oberlehrer Tünber	Ober- tertia					10 Latein. 2 Gesch. 2 Geogr.		3 Französ.				17
Professor Dr. Kirchhoff	Unter- tertia Coet. II.	3 Deutsch 3 Geschichte		2 Gesch.				10 Latein.				18
Oberlehrer Dr. Plauer	Unter- tertia Coet. I.				2 Französ.		8 Latein. 3 Französ. 3 Mathem.		3 Gesch. und Geogr.			19
Gymn.-Lehrer Pomtow	Quarta				2 Deutsch 2 Geogr.			2 Gesch. 2 Geogr.	10 Latein. 6 Griech.			24
Adj. Dr. Hollenberg	Quinta	2 Religion 2 Hebräisch								10 Latein. 2 Deutsch		16
Adj. Dr. Nauck					6 Griech.		6 Griech. 2 Gesch.					14
Adj. Dr. Wehrenpfeinig		3 Deutsch		2 Hebr. 2 Deutsch 2 Religion	2 Religion 2 Hebr.		2 Religion		2 Religion			17
Adj. Dr. Simon		2 Physik		2 Physik				3 Mathem.	3 Raum- lehre und Rechnen	3 Rechnen	4 Rechnen	17
Adj. Diltbey	Sexta					2 Deutsch 2 Religion					10 Latein. 2 Deutsch	16
Adj. Dr. Schmieder					2 Latein.			6 Griech. 2 Deutsch	2 Deutsch 2 Französ. 2 Religion			11

Vertheilung der Lehrstunden unter die Lehrer.

[illegible]





SOUND

JAN 21 1927

UNIV. OF MICH.
LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06840 7512

